

A7-Introducción a series de tiempo

Josue Salvador Cano Martinez

2022-11-10

```
# Tabla de vectores
t <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
y <- c(17, 21, 19, 23, 18, 16, 20, 18, 22, 20, 15, 22)

df <- data.frame(t, y)
```

```
# Promedios Móviles
l = length(df$t)
n = 3
p = NA
e = NA

for (i in 1: (l - 3)){
  p[i + 3] = (y[i] + y[i + 1] + y[i + 2]) / 3
  e[i + 3] = p[i + 3] - y[i + 3]
}


T <- data.frame(t, p, y, e^2)
T
```

```
##      t  p  y e.2
## 1    1 NA 17  NA
## 2    2 NA 21  NA
## 3    3 NA 19  NA
## 4    4 19 23  16
## 5    5 21 18   9
## 6    6 20 16  16
## 7    7 19 20   1
## 8    8 18 18   0
## 9    9 18 22  16
## 10  10 20 20   0
## 11  11 20 15  25
## 12  12 19 22   9
```

```
# Cuadrado medio de errores sin NA
CME <- mean(e^2, na.rm = TRUE)
cat("CME Promedios Moviles: ", CME)
```

```
## CME Promedios Moviles:  10.22222
```

```
plot(t, y,type="o", col = c("purple"), main= "Promedios Móviles")
x = (3 + 1):n
lines(x,p[x],type ="o", col =c("blue"))
```



```
# Promedios Móviles Ponderados
p2 = NA
e2 = NA
a = 0.2

for(i in 1:(l - 3)){
  p2[i + 3] = (1 / 6)*y[i] + (2 / 6)*y[i + 1]+(3 / 6)*y[i + 2];
  e[i + 3] = p2[i + 3] - y[i + 3]}

T2=data.frame(t,p2,y,e2^2)
T2
```


##	t	p2	y	e2.2
## 1	1	NA	17	NA
## 2	2	NA	21	NA
## 3	3	NA	19	NA
## 4	4	19.33333	23	NA
## 5	5	21.33333	18	NA
## 6	6	19.83333	16	NA
## 7	7	17.83333	20	NA
## 8	8	18.33333	18	NA

```
## 9 9 18.33333 22 NA
## 10 10 20.33333 20 NA
## 11 11 20.33333 15 NA
## 12 12 17.83333 22 NA
```

```
CME <- mean(e^2, na.rm = TRUE)
cat("\nCME movil pond: ", CME)
```

```
##
## CME movil pond: 11.49074
```

```
plot(t, y, type="o", col="red")
x = (3+1):n
lines(x,p[x], type="o",col="blue")
```



```
# Suavización exponencial
p = NA
e = NA
p[1] = y[1]
p[2] = y[1]
a = 0.2
for(i in 2:n){
  p[i] = a*y[i - 1] + (1 - a)*p[i - 1];
  e[i] = y[i] - p[i]
```

```

}
Te = data.frame(t,p,y,e^2)
Te

```

```

##      t      p  y    e.2
## 1     1  17.0 17     NA
## 2     2  17.0 21  16.00
## 3     3  17.8 19   1.44
## 4     4  17.0 23     NA
## 5     5  17.0 18  16.00
## 6     6  17.8 16   1.44
## 7     7  17.0 20     NA
## 8     8  17.0 18  16.00
## 9     9  17.8 22   1.44
## 10    10 17.0 20     NA
## 11    11 17.0 15  16.00
## 12    12 17.8 22   1.44

```

```

CME <- mean(e^2, na.rm = TRUE)
cat("\nCME suav exp: ", CME)

```

```


##
## CME suav exp:  8.72

```

```

plot(t, y, type = "o", col = "red")
x = 2:n
lines(x,p[x], type = "o",col = "blue")

```



Cuál de los modelos usados es el mejor

CME Promedios Moviles: 10.22

CME movil pond: 11.49

CME suav exp: 8.72

Tomando en cuenta los valores anteriores es posible concluir que el tercer modelo (suav exp) resulta ser el mejor.

Predice cuáles son las ventas de gasolina esperadas para la semana 13

Para pronosticar las ventas de gasolina para la semana 13 con un promedio móvil de tres semanas, se necesita calcular el promedio de ventas para las semanas 10, 11 y 12. el cálculo de este promedio móvil es: $(20 + 15 + 22) / 3 = 19$. Por tanto, el pronóstico para la semana 13 es 19.