



PUERICULTURA

LIGANTE: SORAYA MACÊDO UCHÔA

O que é Puericultura?



É o conjunto de técnicas empregadas para assegurar o perfeito desenvolvimento físico e mental da criança, desde o período de gestação até a idade de 4 ou 5 anos, e, por extensão, da gestação à puberdade.

É o acompanhamento periódico e sistemático da criança cujo foco é a prevenção e a educação em saúde com vistas à intervenção efetiva e apropriada.




Como é a consulta de puericultura?

1. AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO
2. AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
3. NUTRIÇÃO
4. CALENDÁRIO VACINAL



Como é o acompanhamento de puericultura?



- ☐ 0 – 6 meses: MENSAL
- ☐ 6 – 12 meses: BIMESTRAL
- ☐ 1 – 2 anos: TRIMESTRAL
- ☐ 2 – 5 anos: SEMESTRAL
- ☐ A partir dos 5 anos: ANUAL



Crescimento



- **Peso:** é o primeiro parâmetro a ser alterado em distúrbios nutricionais (é o mais sensível);
 - Pesar na balança sentado/deitado até 2 anos ou < 16 kg.
- **Estatura:**
 - Comprimento x Altura
- **Perímetro Cefálico:** até 2 anos
 - Reflete o crescimento do SNC



Fases do Crescimento




INTRAUTERINA:

- AMBIENTE
- INSULINA



LACTENTE:

- NUTRIÇÃO



INFANTIL:

- GH
- POTENCIAL GENÉTICO
- REGULAR



PUBERAL:

- ESTEROIDES SEXUAIS

Fases do Crescimento



1º FASE DE CRESCIMENTO RÁPIDO:

- INTRAUTERINA – 2 ANOS
- DETERMINADA PELA NUTRIÇÃO DA CRIANÇA
- O PESO É UM BOM AVALIADOR ISOLADO DE CRESCIMENTO DA CRIANÇA

2 ANOS - PUBERDADE:

- REGULAR E RELATIVAMENTE HOMOGÊNEO
 - AUMENTO DE 2-3 Kg/ano E 6 – 7 cm /ano
- DETERMINADO PELO POTENCIAL GENÉTICO E GH

2º FASE DE CRESCIMENTO RÁPIDO:

- DURANTE A PUBERDADE
- DETERMINADO PELOS HORMÔNIOS SEXUAIS E GH

Desenvolvimento



- É o conjunto de todas as reações da criança, todo o seu comportamento que evolui progressivamente ao longo do tempo sob a forma de funções e habilidades cada vez mais específicas.

- ✓ Motor (grosseiro e fino)
- ✓ Adaptativo
- ✓ Social
- ✓ Linguagem



Desenvolvimento

- O desenvolvimento geralmente é sequencial:

- Crânio → Caudal
- Cubital → Radial
- Primeiro pega → Depois solta





Anamnese



☐ CONDIÇÕES DE NASCIMENTO:

TIPO DE PARTO, LOCAL DE PARTO, PESO AO NASCER, IDADE GESTACIONAL, ÍNDICE DE APGAR, INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS NA GESTAÇÃO, NO PARTO E NO PERÍODO NEONATAL (SE SIM, OS TRATAMENTOS REALIZADOS), ALEITAMENTO MATERNO NA MATERNIDADE, DATA DA ALTA E PESO DA ALTA

☐ ANTECEDENTES FAMILIARES:

CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS PAIS E IRMÃOS
NÚMERO DE GESTAÇÕES ANTERIORES
NÚMERO DE IRMÃOS



❑ EXAMES DE TRIAGEM NEONATAL:

TESTE DA ORELHINHA
TESTE DO OLHINHO
TESTE DO CORAÇÃOZINHO
TESTE DO PEZINHO


❑ IMUNIZAÇÕES

❑ CUIDADOS AO RECÉM-NASCIDO:

LAVAR AS MÃOS
COTO UMBILICAL
TROCA DE FRALDAS

TRIAGEM NEONATAL – TESTE DO OLHINHO OU TESTE DO REFLEXO VERMELHO

NORMAL



REFLEXO VERMELHO
PRESENTE BILATERAL

ANORMAL



REFLEXO VERMELHO
DUVIDOSO NO OLHO DIREITO



REFLEXO VERMELHO
AUSENTE NO OLHO DIREITO

1. CATARATA CONGÊNITA
2. GLAUCOMA
3. RETINOBLASTOMA
4. RETINOPATIA DA PREMATURIDADE
5. CEGUEIRA



TRIAGEM NEONATAL – TESTE DA ORELHINHA

- ✓ Avalia a integridade da função auditiva;
- ✓ Deve ser realizado até 28 dias de vida.




TRIAGEM NEONATAL – TESTE DO CORAÇÃOZINHO



- ✓ Detecta cardiopatias congênicas;
- ✓ Deve ser realizado nas primeiras 24 – 48 horas de vida.



TRIAGEM NEONATAL - TESTE DO CORAÇÃOZINHO



TRIAGEM NEONATAL - TESTE DO PEZINHO



TRIAGEM NEONATAL – TESTE DO PEZINHO

I - etapa 1:

- a) fenilcetonúria e outras hiperfenilalaninemias;
- b) hipotireoidismo congênito;
- c) doença falciforme e outras hemoglobinopatias;
- d) fibrose cística;
- e) hiperplasia adrenal congênita;
- f) deficiência de biotinidase;
- g) toxoplasmose congênita;

II - etapa 2:

- a) galactosemias;
- b) aminoacidopatias;
- c) distúrbios do ciclo da ureia;
- d) distúrbios da betaoxidação dos ácidos graxos;

III - etapa 3: doenças lisossômicas;

IV - etapa 4: imunodeficiências primárias;

V - etapa 5: atrofia muscular espinal.





☐ ALIMENTAÇÃO:

ALEITAMENTO MATERNO
ALEITAMENTO ARTIFICIAL
INTRODUÇÃO ALIMENTAR

☐ ELIMINAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS
FREQUÊNCIA
USO DE FRALDAS OU
DESFRALDE

☐ HIGIENE:

Nº DE BANHOS/DIA
HIGIENE ORAL
USO DE PRODUTOS

☐ SONO/REPOUSO:

CARACTERÍSTICA
Nº DE HORAS/DIA

☐ DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR

HABILIDADES ESPERADAS
PARA A FAIXA ETÁRIA

Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor

Instrumento de Avaliação do Desenvolvimento Integral da Criança

DADOS DE AVALIAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA
Perímetro cefálico < -2Zescores ou > +2Zescores; ou Presença de 3 ou mais alterações fenotípicas*; ou Ausência de 1 ou mais reflexos/posturas/habilidades para a faixa etária anterior (se a criança estiver na faixa de 0 a 1 mês, considere a ausência de 1 ou mais reflexos/posturas/habilidades para a sua faixa etária suficiente para esta classificação).	PROVÁVEL ATRASO NO DESENVOLVIMENTO	✓ Referir o caso para avaliação neuropsicomotora.
Ausência de 1 ou mais reflexos/posturas/habilidades para a sua faixa etária (para crianças de 1 mês a 6 anos).	ALERTA PARA O DESENVOLVIMENTO	✓ Orientar a mãe/cuidador sobre a estimulação da criança.
Todos os reflexos/posturas/habilidades para a sua faixa etária estão presentes, mas existe 1 ou mais fatores de risco.	DESENVOLVIMENTO ADEQUADO COM FATORES DE RISCO	✓ Marcar consulta de retorno em 30 dias. Informar a mãe/cuidador sobre os sinais de alerta para retornar antes de 30 dias.
Todos os reflexos/posturas/habilidades para a sua faixa etária estão presentes.	DESENVOLVIMENTO NORMAL	✓ Elogiar a mãe/cuidador. ✓ Orientar a mãe/cuidador para que continue estimulando a criança. ✓ Marcar retorno para acompanhamento conforme a rotina do serviço de saúde. ✓ Informar a mãe/cuidador sobre os sinais de alerta orientando-a a retornar antes de 30 dias caso os observe.

* Exemplos de alterações fenotípicas mais frequentes: fenda palpebral oblíqua, implantação baixa de orelhas, lábio leporino, fenda palatina, pescoço curto e/ou largo, prega palmar única e quinto dedo da mão curto e recurvado.

Marcos	Como Pesquisar	Idade em meses					
		1	2	3	4	5	6
Postura : Pernas e braços fletidos, cabeça lateralizada	Deite a criança em superfície plana, de costas com a barriga para cima; observe se seus braços e pernas ficam flexionados e sua cabeça lateralizada.						
Observa um rosto	Posicione seu rosto a aproximadamente 30cm acima do rosto da criança. Observe se a criança olha para você, de forma evidente.						
Reage ao som	Bata palma ou balance um chocalho a cerca de 30 cm de cada orelha da criança e observe se ela reage com movimentos nos olhos ou mudança da expressão facial.						
Eleva a cabeça	Coloque a criança de bruço e observe se ela levanta a cabeça, desencosta o queixo da superfície, sem virar para um dos lados.						
Sorri quando estimulada	Sorria e converse com a criança; não lhe faça cócegas ou toque sua face. Observe se ela responde com um sorriso						
Abre as mãos	Observe se em alguns momentos a criança abre as mãos espontaneamente.						
Emite sons	Observe se a criança emite algum som, que não seja choro. Caso não seja observado pergunte ao acompanhante se faz em casa.						
Movimenta os membros	Observe se a criança movimenta ativamente os membros superiores e inferiores.						
Responde ativamente ao contato social	Fique a frente do bebê e converse com ele. Observe se ele responde com sorriso e emissão de sons como se estivesse "conversando" com você. Pode pedir que a mãe o faça.						
Segura objetos	Ofereça um objeto tocando no dorso da mão ou dedos da criança. Esta deverá abrir as mãos e segurar o objeto pelo menos por alguns segundos.						
Emite sons, ri alto	Fique a frente da criança e converse com ela. Observe se ela emite sons (Gugu, eeee, etc...), veja se ela ri emitindo sons (gargalhada).						
Levanta a cabeça e apoia-se nos antebraços, de bruços	Coloque a criança de bruços, numa superfície firme. Chame sua atenção a frente com objetos ou seu rosto e observe se ela levanta a cabeça apoiando-se nos antebraços.						
Busca ativa de objetos	Coloque um objeto ao alcance da criança (sobre a mesa ou na palma de sua mão) chamando sua atenção para o mesmo. Observe se ela tenta alcançá-lo.						
Leva objetos a boca	Ofereça um objeto na mão da criança e observe se ela o leva a boca.						
Localiza o som	Faça um barulho suave (sino, chocalho, etc...) próximo a orelha da criança e observe se ela vira a cabeça em direção ao objeto que produziu o som. Repita no lado oposto.						
Muda de posição (rola)	Colocar a criança em superfície plana de barriga para cima. Incentivá-la a virar para a posição de bruços.						

Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor

74

Acompanhando o desenvolvimento infantil de 6 meses a 1 ano e meio (18 meses)

Marcos	Como Pesquisar	Idade em meses											
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Brinca de esconde-achou	Coloque-se à frente da criança e brinque de aparecer e desaparecer, atrás de um pano ou de outra pessoa. Observe se a criança faz movimentos para procurá-lo quando desaparece, como tentar puxar o pano ou olhar atrás da outra pessoa.												
Transfere objetos de uma mão para outra	Ofereça um objeto para que a criança segure. Observe se ela o transfere de uma mão para outra. Se não fizer, ofereça outro objeto e observe se ela transfere o primeiro para outra mão.												
Duplica sílabas	Observe se a criança fala "papa", "dada", "mama". Se não o fizer pergunte a mãe se o faz em casa.												
Senta-se sem apoio	Coloque a criança numa superfície firme, ofereça-lhe um objeto para que ela segure e observe se ela fica sentada sem o apoio das mãos para equilibrar-se.												
Imita gestos	Faça algum gesto conhecido pela criança como bater palmas ou dar tchau e observe se ela o imita. Caso ela não o faça, peça a mãe para estimulá-la.												
Faz pinça	Coloque próximo a criança uma jujuba ou uma bolinha de papel. Chame atenção da criança para que ela o pegue. Observe se ao pegá-lo ela usa o movimento de pinça, com qualquer parte do polegar associado ao indicador.												
Produz "jargão"	Observe se a criança produz uma conversação incompreensível consigo mesma, com você ou com a mãe (jargão). Caso não for possível observar pergunte se ela o faz em casa.												
Anda com apoio	Observe se a criança consegue dar alguns passos com apoio.												
Mostra o que quer	A criança indica o que quer sem que seja através do choro, podendo ser através de palavras ou sons, apontando ou estendendo a mão para alcançar. Considere a informação do acompanhante.												
Coloca blocos na caneca	Coloque 3 blocos e a caneca sobre a mesa, em frente à criança. Estimule-a a colocar os blocos dentro da caneca, através de demonstração e fala. Observe se a criança consegue colocar pelo menos um bloco dentro da caneca e soltá-lo.												
Diz uma palavra	Observe se durante o atendimento a criança diz pelo menos uma palavra que não seja nome de membros da família ou de animais de estimação. Considere a informação do acompanhante.												
Anda sem apoio	Observe se a criança já anda bem, com bom equilíbrio, sem se apoiar.												
Usa colher ou garfo	A criança usa colher ou garfo, derramando pouco fora da boca. Considere a informação do acompanhante.												
Constrói torre de 2 cubos	Observe se a criança consegue colocar um cubo sobre o outro sem que ele caia ao retirar sua mão.												
Fala 3 palavras	Observe se durante o atendimento a criança diz três palavras que não sejam nome de membros da família ou de animais de estimação. Considere a informação do acompanhante.												
Anda para trás	Peça a criança para abrir uma porta ou gaveta e observe se ela dá dois passos para trás sem cair.												

Marcos	Como Pesquisar	Idade em meses															
		19 a 24				25 a 30				31 a 36				37 a 42			
Tira roupa.	Observe se criança é capaz de remover alguma peça de roupa, tais como: sapatos que exijam esforço para sua remoção, casacos, calças ou camisetas. Considere a informação do acompanhante.																
Constrói torre de 3 cubos	Observe se a criança consegue empilhar 3 cubos sem que eles caiam ao retirar sua mão.																
Aponta 2 figuras	Observe se a criança é capaz de apontar 2 de um grupo de 5 figuras.																
Chuta bola	Observe se a criança chuta a bola sem apoiar-se em objetos.																
Veste-se com supervisão	Pergunte aos cuidadores se a criança é capaz de vestir alguma peça de roupa tais como: cueca, meias, sapatos, casaco, etc...																
Constrói torre de 6 cubos	Observe se a criança consegue empilhar 6 cubos sem que eles caiam ao retirar sua mão.																
Frases com 2 palavras	Observe se a criança combina pelo menos 2 palavras formando uma frase com significado que indique uma ação, tais como: "quer água", "quer papai", "chuta bola". Considere a informação do acompanhante.																
Pula com ambos os pés	Observe se pula com os dois pés, atingindo o chão ao mesmo tempo, mas não necessariamente no mesmo lugar.																
Brinca com outras crianças	Pergunte ao acompanhante se a criança participa de brincadeiras com outras crianças de sua idade.																
Imita linha vertical	Observe, após demonstração, se a criança faz uma linha ou mais (no papel), de pelo menos 5 cm de comprimento.																
Reconhece 2 ações.	Observe se a criança aponta a figura de acordo com a ação, tais como: "quem mia?", "quem late?", "quem fala?", "quem galopa?".																
Arremessa bola	Observe se a criança arremessa a bola acima do braço.																
Veste uma camiseta	Pergunte aos cuidadores se a criança é capaz de vestir sua camiseta e/ou casaco sem botão ou zíper, sem ajuda.																
Mova o polegar com a mão fechada	Demonstre para criança e observe se ela é capaz de mover o polegar para cima em sinal de "OK" ou "legal" ou "tudo bem", com uma ou ambas as mãos.																
Compreende 2 adjetivos	Verifique se a criança é capaz de compreender 2 adjetivos. Pergunte: "O que você faz quando está com fome?", "O que você faz quando está com frio?", "O que você faz quando está cansado?". Verifique se suas respostas são coerentes, tais como: "Eu como", "Eu visto casaco", "Eu vou deitar", etc.																
Equilibra-se em cada pé 1 segundo	Após demonstração, verifique se a criança consegue equilibrar-se em um pé só, sem apoiar-se em nenhum objeto, pelo menos um segundo, dando-lhe 3 tentativas. Repita com o outro pé.																

75

Acompanhando o desenvolvimento infantil de 1 ano e meio (19 meses) a 3 anos e meio (42 meses)

Acompanhando o desenvolvimento infantil de 3 anos e meio (43 meses) a 5 anos (60 meses)

Marcos	Como Pesquisar	Idade em meses								
		43 a 48			49 a 54			55 a 60		
Emparelha cores	Observe se a criança é capaz de emparelhar objetos da mesma cor, como por exemplo os cubos.									
Copia círculos	Forneça a criança um lápis e uma folha de papel. Mostre-lhe a figura de um círculo e verifique se ela é capaz de desenhar qualquer forma de aproximação com um círculo, que esteja fechada ou quase fechada.									
Fala inteligível	Durante a avaliação observe a inteligibilidade da fala da criança (articulação e verbalização de idéias em sequência).									
Pula em um pé só	Demonstre e verifique se a criança consegue pular em um pé só, 2 ou mais vezes, sem apoiar-se em nenhum objeto.									
Veste-se sem ajuda	Pergunte aos cuidadores se a criança é capaz de se vestir, sem nenhuma ajuda.									
Copia cruz	Forneça a criança um lápis e uma folha de papel. Mostre-lhe a figura de uma cruz e verifique se ela é capaz de desenhar 2 linhas que se cruzem próximo ao seu ponto médio.									
Compreende 4 preposições	Dê a criança um bloco e peça: "Coloque o bloco em cima da mesa", "Coloque o bloco embaixo da mesa", "Coloque um bloco na minha frente", "Coloque um bloco atrás de mim". Observe se ela cumpre adequadamente os 4 comandos.									
Equilibra-se em cada pé 3 segundos	Procedimento semelhante a "Equilibra-se em cada pé 1 segundo" com o tempo de 3 segundos ou mais.									
Escova dentes sem ajuda	Pergunte aos cuidadores se a criança é capaz de escovar os dentes, sem ajuda ou supervisão (durante algum tempo), inclusive na colocação da pasta de dentes, na escovação dos dentes posteriores e no uso do fio dental. Verifique se a criança recebeu treino para isto.									
Aponta a linha mais comprida	Mostre para a criança uma ficha contendo o desenho de duas linhas paralelas em posição vertical. Verifique se ela é capaz de apontar a linha mais comprida, mesmo mudando a posição do papel. Em 3 tentativas, mudando a posição do papel, ela deve acertar as 3, ou 5 em 6 tentativas.									
Define 5 palavras	Verifique se a criança é capaz de definir 5 palavras. Faça perguntas do tipo "O que é uma bola?" ou "O que você sabe sobre o rio?". Use palavras do seu contexto de vida. Terá que responder 5 de 7 palavras. A definição é aceitável quando inclui: 1) uso; 2) forma; 3) material do que é feito; 4) categoria geral. Ex. Rio= tem peixe, água, pescar.									
Equilibra-se em um pé 5 segundos	Procedimento semelhante a "Equilibra-se em cada pé 1 segundo" com o tempo de 5 segundos ou mais.									

Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor



Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor



Marcos	Como Pesquisar	Idade em meses					
		61 a 66			67 a 72		
Brinca de fazer-de-conta com outras crianças	Pergunte aos cuidadores se a criança participa de brincadeiras de fazer-de-conta (ex. casinha, escola), tanto no contexto familiar quanto no escolar.						
Desenha pessoa com 6 partes	Forneça à criança um lápis e uma folha de papel (sem pauta). Peça a ela para que desenhe uma pessoa (menino, menina, mamãe, papai etc.). Certifique-se de que ela tenha terminado o desenho antes de pontuar o item do teste. As partes do corpo presentes em pares deverão ser consideradas como uma parte apenas (orelhas, olhos, braços, mãos, pernas e pés). Considere como certo somente se ambas as partes do par forem desenhadas.						
Faz analogia	Pergunte à criança, devagar e distintamente, uma questão de cada vez: "Se o cavalo é grande, o rato é...", "Se o fogo é quente, o gelo é...", "Se o Sol brilha durante o dia, a lua brilha durante..." A criança deverá completar corretamente 2 das 3 frases.						
Marcha ponta-calcanhar	Demonstre à criança como andar em linha reta, encostando a ponta de um pé no calcanhar do outro. Ande aproximadamente 8 passos desta forma, e então peça para que a criança o imite. Se necessário, demonstre várias vezes (pode se facilitar a compreensão, comparando-se este andar com o "andar na corda bamba"). Até 3 tentativas são permitidas. Se a criança conseguir dar 4 ou mais passos em linha reta, com o calcanhar a, no máximo, 2,5cm da ponta do pé, sem apoiar-se, terá alcançado este marco.						
Aceita e segue regras nos jogos de mesa	Pergunte aos cuidadores se a criança é capaz de aceitar e seguir regras dos jogos de mesa.						
Copia um quadrado	Forneça à criança um lápis e uma folha de papel (sem pauta). Mostre a ela o desenho de um quadrado. Não nomear a figura nem mover seu dedo ou o lápis para demonstrar como desenhá-la. Peça para a criança "Faça um desenho como este!". Podem ser fornecidas 3 tentativas. Se a criança for incapaz de copiar o quadrado da ficha, mostre a ela como fazê-lo, desenhando 2 lados opostos (paralelos) e depois os outros 2 lados opostos (ao invés de desenhar o quadrado com um movimento contínuo). Três demonstrações e tentativas podem ser fornecidas.						
Define 7 palavras	Procedimento semelhante ao item "Define 5 palavras" com 7 palavras.						
Equilibra-se em cada pé por 7 segundos	Procedimento semelhante a "Equilibra-se em cada pé 1 segundo" com o tempo de 7 segundos ou mais.						

Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor



78

Acompanhando o desenvolvimento infantil de 6 a 10 anos

Idade	A partir dos 6 anos de idade é importante avaliar como está o aprendizado na escola, a socialização desta criança com outras crianças, se sua fala e seu comportamento são adequados, etc.
em anos	Anotações referentes a cada faixa etária:
6 a 7	
7 a 8	
8 a 9	
9 a 10	

Exame Físico





☐ SINAIS VITAIS:

- ✓ FC
- ✓ FR
- ✓ TAX
- ✓ PA

PRESSÃO: $\text{IDADE} \times 2 + 70\text{mmHg}$ (SISTÓLICA)
AFERIR A PRESSÃO A PARTIR DOS 3 ANOS DE IDADE

Frequência Cardíaca

Tabela 2 - Frequência cardíaca normal

Idade	Variação	Média normal
Recém-nato	De 70 a 170	120
11 meses	De 80 a 160	120
2 anos	De 80 a 130	110
4 anos	De 80 a 120	100
6 anos	De 75 a 115	100
8 anos	De 70 a 110	90
10 anos	De 70 a 110	90

Fonte: DIECKMANN; BROWNSTEIN; GAUSCHE-HILL, 2000, p. 43-45.




PERDA FISIOLÓGICA (PARA RN): na 1ª semana de vida
pode perder até 10% de peso do nascimento

□ PESO:

PESO ESTIMADO: $\text{IDADE} \times 2 + 8 \text{ kg}$ (2 a 10 anos)

CÁLCULO DO GANHO PONDERAL: $\text{PESO ATUAL} - \text{PESO ANTERIOR} / \text{N}^\circ \text{ DE DIAS}$
1º TRIMESTRE: 700 g (23 g/dia)
2º TRIMESTRE: 600 g (20 g/dia)
3º TRIMESTRE: 500 g (16,6 g/dia)
4º TRIMESTRE: 400 g (13,3 g/dia)

Avaliação do Crescimento






COMPRIMENTO/ESTATURA ESTIMADA:
 $(\text{IDADE} - 3) \times 6 + 95 \text{ cm}$

□ COMPRIMENTO/ESTATURA:

50 cm AO NASCIMENTO
15 cm NO 1º SEMESTRE
10 cm NO 2º SEMESTRE
10 cm DO 1º - 2º ANO
10 cm DO 2º - 3º ANO



Avaliação do Crescimento



Avaliação do Crescimento




Gráfico de IMC por idade de zero a 2 anos



□ PERIMETRO CEFÁLICO:

NASCIMENTO: 33 – 36 cm

1º TRIMESTRE: 6 cm

1º TRIMESTRE: 3 cm


2º SEMESTRE: 3 cm

Avaliação do Crescimento



82

Gráfico de perímetro cefálico por idade



☐ DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PSICOAFETIVO

☐ ESTADO GERAL

☐ PELE

☐ FACE

☐ CRÂNIO

☐ OLHOS

☐ ORELHAS E AUDIÇÃO

☐ NARIZ

☐ BOCA

☐ PESCOÇO

☐ TÓRAX

☐ ABDOME

☐ GENITÁLIA

☐ ÂNUS E RETO

☐ SISTEMA OSTEOARTICULAR

☐ COLUNA VERTEBRAL

☐ AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA





Obrigada!
