

Revisão para OSCE – HAM V

Ortopedia: coluna cervical, lombar, membros superiores e inferiores

Monitor: Lucas Ferreira

Coluna cervical


Exame físico

- Inspeção:
 - Inspeção estática
 - Inspeção dinâmica
- Palpação
- Testes e sinais especiais


Teste da distração



Manobra de Spurling



Sinal de Lhermitte



Teste de Adson






Figura 1.31 – Teste de Adson.



Coluna lombar

Teste de elevação do membro inferior



Teste de Patrick ou Fabere



Teste de Trendelenburg



Membros superiores

Ombro

Testes relacionados com a
dor e mobilidade muscular

Sinal e teste do impacto de Neer



Teste do impacto de Hawkins-Kennedy



Teste do impacto de Yokum



Teste do impacto subcoracoide de Gerber



Teste do supraespinal



Teste de Jobe




Teste do infraespinal




Teste do infraespinal de Patte




Teste da rotação externa não mantida ou teste da “cancela”




Teste da “cancela” (horn blower’s sign) / Teste da “queda do braço” (“drop arma sign”)



Teste do subescapular de Gerber (lift-off test)



Lift-off test – lag sign



Teste do subescapular (“abdominal press test”)



Teste da rotação interna



Testes e sinais relacionados à estabilidade

Teste da apreensão



Teste da instabilidade posterior (teste de Fukuda)



Teste da gaveta anteroposterior



Teste do sulco



Teste da translação




Teste da recolocação




Cotovelo

Epicondilite medial e lateral


Teste de Cozen




Teste de Mill



Teste de Maudsley




Teste da epicondilite medial




Punho

Síndrome do túnel do carpo



Teste de Phalen clássico



Teste de Tinel




Teste de Allen




Quadril pediátrico

DDQ (displasia do desenvolvimento do quadril)

Sinal de Ortolani



Sinal de Barlow



Membros inferiores

Joelho

Na inspeção...(geno varo e geno valgo)




Testes meniscais


Teste de McMurray



Teste de Appley



Teste de Steinmann



Sinal de Smillie

- Sinal de Smillie: a palpação das interlinhas articulares também é importante na avaliação das lesões meniscais. As lesões do corno posterior do menisco medial frequentemente causam dor junto à interlinha medial, ao contrário das afecções patelares que podem causar dor nas regiões anterior e medial. As lesões do menisco lateral, por sua vez, podem causar dor junto às regiões anterior e lateral do joelho. A dor à palpação da interlinha correspondente é o sinal de Smillie para lesão meniscal.

Marcha de pato




Teste de função ligamentar

Teste de Lachman ("Richey test")



Teste da gaveta anterior





Teste da gaveta posterior



Sinal dos “muitos dedos” (“too many toes”)



Referências bibliográficas



BOA PROVA!