

Первые 40 минут пропущены

## Степенные ряды

Пример.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N+1} = 1$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$f''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x^{n-1} = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Интегрируем:

$$f'(x) = \sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) + C$$

При  $x = 0$   $C = 0$

Ещё раз интегрируем:

$$\sum \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = -\int \ln(1-x) dx = (1-x) \ln(1-x) + x + C$$

При  $x = 0$   $C = 0$

$$\sum \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{x \rightarrow 1-0} (1-x) \ln(1-x) + x = 1$$

Следствие (т. Абеля).

- $\sum a_n = A$
- $\sum b_n = B$
- $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0$
- $\sum c_n = C$

Тогда  $C = AB$

Доказательство.  $f(x) = \sum a_n x^n, g(x) = \sum b_n x^n, h(x) = \sum c_n x^n, x \in [0, 1]$

При  $x = 1$  есть абсолютная сходимость  $f(x)$  и  $g(x)$ . Можно перемножать:  $f(x)g(x) = h(x)$ , при  $x \rightarrow 1-0$   $A \cdot B = C$  □

## Экспонента (комплексной переменной)

**Определение.**

$$\exp(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

**Свойства:**

$$1. \exp(0) = 1$$

$$2. \exp(z)' = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} = \exp z$$

Возвращаем кредит: в первом семестре говорилось, что  $\exists f_0$  — показательная функция, такая что  $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$  и  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_0(x)-1}{x} = 1$

$$f_0(x) := \exp(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = \exp'(0) = 1$$

**Теорема 0.1.**

$$\forall z, w \in \mathbb{C} \quad \exp(z+w) = \exp z \cdot \exp w$$

*Упражнение.* Доказать к следующей лекции

## Теория меры

### Системы множеств

Здесь и далее система  $\iff$  множество, так говорится, чтобы избежать “множество множеств”

**Обозначение.**  $A_i$  — множества. Тогда  $\bigsqcup_i A_i$  — дизъюнктное объединение.

$A_i$  — попарно не пересекаются  $\iff$  “ $A_i$  — дизъюнктно”

**Определение.**  $X$  — множество, тогда  $2^X$  — система всех подмножеств  $X$ .

$\mathcal{P} \subset 2^X$  — **полукольцо**, если:

- $\emptyset \in \mathcal{P}$
- $\forall A, B \in \mathcal{P} \quad A \cap B \in \mathcal{P}$
- $\forall A, A' \in \mathcal{P} \quad \exists$  кон. и дизъюнктные  $B_1 \dots B_n \in \mathcal{P} : A \setminus A' = \bigsqcup_i B_i$

*Пример.* 1.  $2^X$  — полукольцо

2.  $X = \mathbb{R}^2, \mathcal{P}$  — ограниченные подмножества, в том числе  $\emptyset$

3.

*Определение.* Ячейка в  $\mathbb{R}^m$   $[a, b) = \{x \in \mathbb{R}^m : \forall i \ x_i \in [a_i, b_i)\}$

$\mathcal{P}$  — множество ячеек в  $\mathbb{R}^m$  — полукольцо.


*Доказательство.*  $\triangleleft m = 2$

(a) Очевидно

(b)  $A \cap B = [a, a') \cap [b, b') = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \forall i = 1, 2 \ \max(a_i, b_i) \leq x_i < \min(a'_i, b'_i)\}$

(c)  $A \setminus A' = \bigsqcup_{i=1}^8 B_i$

□



4.  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$\forall i \ A_i := A$$

$$X = \bigotimes_{i=1}^{+\infty} A_i = \{(a_1, a_2, a_3, \dots), \forall i \ a_i \in A_i\}$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_k \end{pmatrix}, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \forall l \ \alpha_l \in A_{i_l}$$

$$\mathcal{P} = \{X_\sigma\}_\sigma$$

$$X_\sigma = \{a \in X : a_{i_1} = \alpha_1, \dots, a_{i_k} = \alpha_k\}$$

$\mathcal{P}$  — полукольцо

$$(a) \emptyset = X_\sigma, \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(b) X_\sigma \cap X_{\sigma'} = X_{\sigma \cup \sigma'}$$

$$(c) X_\sigma \setminus X_{\sigma'}$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}, \sigma' = (2) 1$$

$$X_\sigma \setminus X_{\sigma'} = \text{на первой координате 6, на второй — не 1} = X_{\sigma_2} \cap X_{\sigma_3} \cap \dots \cap X_{\sigma_6}, \sigma_k = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & k \end{pmatrix}.$$

5. Ячейки с рациональными координатами.

Свойства:

1. Как показывают примеры:

$$(a) A \in \mathcal{P} \not\Rightarrow A^c = X \setminus A \in \mathcal{P}$$

(b)  $A, B \in \mathcal{P}$ , нельзя утверждать, что:

- $A \cap B \notin \mathcal{P}$
- $A \setminus B \notin \mathcal{P}$
- $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \notin \mathcal{P}$

2. Модернизируем утверждение 3:

$A, A_1 \dots A_n \in \mathcal{P}$ . Тогда  $A \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$  — представимо в виде дизъюнктного объединения элементом  $\mathcal{P}$

*Доказательство.* Докажем по индукции по  $n$ .

База ( $n = 1$ ) — аксиома 3.

Переход:

$$\begin{aligned} A \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_n) &= (A \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_{n-1})) \setminus A_n \\ &= \left( \bigsqcup_{i=1}^k B_i \right) \setminus A_n \\ &= \bigsqcup_{i=1}^k (B_i \setminus A_n) \\ &= \bigsqcup_{i=1}^k \bigsqcup_{j=1}^{l_i} D_{ij} \end{aligned}$$

□

**Определение.**  $\vartheta \subset 2^X$  — алгебра подмножеств в  $X$ :

1.  $\forall A, B \in \vartheta \quad A \setminus B \in \vartheta$
2.  $X \in \vartheta$

Свойства:

1.  $\emptyset = X \setminus X \in \vartheta$
2.  $A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \vartheta$
3.  $A^c = X \setminus A \in \vartheta$
4.  $A \cup B \in \vartheta$ , потому что  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
5.  $A_1 \dots A_n \in \vartheta \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i, \bigcap_{i=1}^n A_i \in \vartheta$  — по индукции
6. Всякая алгебра есть полукольцо

Обратное неверно, см. пример 2.

*Пример.* 1.  $2^X$

2.  $X = \mathbb{R}^2, \vartheta$  — ограниченные подмножества или их дополнения.