Конспект по дискретной математике

October 15, 2019

1 Оценка числа элементов в схеме

Теорема 1.1. B_1 и B_2 $\exists c\ \forall f\ \ size_{B_1}(f) \leq c \cdot size_{B_2}$

Доказывалась ранее.

Теорема 1.2. О нижней оценке. Почти все функции требуют $\Omega(\frac{2^n}{n})$ элементов в своей записи. Альтернативная формулировка:

$$f(n) = \frac{2^n}{n} \quad g(n) : \frac{g}{f} \to 0 \quad F_g = \{\text{булевы функции, } size \leq g(n)\}$$

Тогда

$$\frac{|F_g|}{2^{2^n}} \to 0$$

Теорема 1.3. О верхней оценке.

$$\forall f - \text{бул. ф. } \exists \text{схема из ф.э., содержащая } O\left(\frac{2^n}{n}\right) \text{ элементов}$$

2 Линейная программа

Пример для $x_1 \oplus x_2$:

$y_1 = \neg x_1$
$y_2 = \neg x_2$
$y_3 = x_1 \wedge y_2$
$y_4 = x_2 \wedge y_1$
$y_5 = y_3 \vee y_4$

Линейная программа — нумерованное множество строк вида

$$(a, [i_1 \dots i_k]), \text{ где } a \in B\textit{(базис)}, i_j - \text{индексы переменных}, a : \mathbb{B}^k \to \mathbb{B}$$

Теорема 2.1. Для $f\exists$ линейная программа длины $r \Leftrightarrow \exists$ схема из r функциональных элементов.

Оценка: сколько линейных программ над $\{\downarrow\}$ длины r?
Первая строка: n^2 вариантов *(выбор 2 объектов из n)*
Вторая строка: $(n+1)^2$ варинатов *(выбор 2 объектов из n и y_1)*
$\vdots$
$(n+r-1)^2$

$$K_{n,r} = \prod_{i=0}^{r-1}(n+i)^2 \leq (n+r)^{2r}$$

$$\log_2 K_{n,r} \leq \log_2(n+r)^{2r} = 2r\log_2(n+r)$$

Лемма 1.

$$\exists \textit{ функция: } size_B(f) \geq \frac{2^n}{2n}$$

Доказательство. Предположим противное:

$$r < \frac{2^n}{2n}$$

$$\log_2 K_{n,r} \leq 2r\log_2(n+r) < \frac{2\cdot 2^n}{2n}\log_2(n+\frac{2^n}{2n}) \leq \frac{2^n}{n}\log_2 2^n = 2^n$$

$$\Rightarrow K_{n,r} < 2^{2^n}!!!$$

Обощим для произвольного c:

$$r < \frac{2^n}{2cn}$$

$$\log_2 K_{n,r} \leq 2r\log_2(n+r) < \frac{2\cdot 2^n}{2cn}\log_2(n+\frac{2^n}{2cn}) \leq \frac{2^n}{cn}\log_2 2^n = \frac{2^n}{c}$$

$$\Rightarrow K_{n,r} < 2^{\frac{2^n}{c}}!!!$$

□

Вернемся к доказательству теоремы 2.

Доказательство.

$$\frac{|F_g|}{2^{2^n}} \to 0$$

$$\frac{2^{\frac{2^n}{c}}}{2^{2^n}} = 2^{2^n \cdot (\frac{1}{n} - 1)} \to 0$$

□

Теорема 2.2. $\forall f$ $\exists$схема из функ.эл.$O(\frac{2^n}{n})$