

7 Sinais de TDAH em Adultos

Se você se identifica com 4 ou mais itens abaixo, vale conversar com um profissional — e entender que isso tem nome.

01 **Você começa mil coisas e termina quase nenhuma**

Projetos abandonados na metade, abas abertas no navegador, cursos pela metade. Não é falta de vontade — o seu cérebro perde o acesso à dopamina quando a novidade some. Isso tem nome: disfunção executiva.

02 **Procrastinação paralisante — especialmente no que importa**

Você faz tudo menos a tarefa principal. Arruma a casa, responde e-mails antigos, assiste mais um vídeo. Quanto mais importante a tarefa, mais difícil começar. No TDAH, isso não é escolha consciente.

03 **Hiperfoco: concentração extrema nas coisas erradas**

Consegue passar 6 horas num hobby, mas 20 minutos numa planilha parece impossível. O hiperfoco não é um superpoder — é o mesmo sistema de regulação de atenção desregulado, só que puxado por interesse em vez de obrigação.

04 **Memória de trabalho fraca — esquece o que acabou de ouvir**

Alguém te fala três coisas e você lembra só de uma. Você entra num cômodo e esquece por

06 Impulsividade — nas compras, nas palavras, nas decisões

Compras por impulso, interromper pessoas no meio da fala, tomar decisões rápidas que depois se arrependem. A impulsividade no adulto com TDAH é menos visível que na criança, mas igualmente custosa.

07 Sensação crônica de estar 'aquém do potencial'

Você sabe que é capaz, já deu provas disso. Mas existe um padrão de resultados inconsistentes, de 'poderia ser mais' que persiste há anos. Essa lacuna entre potencial e entrega é uma das marcas mais dolorosas do TDAH adulto.

Se marcou 4 ou mais — continue lendo.

O ebook **Seu Cérebro Não Tá Quebrado** explica cada um desses sinais com base científica, traduz pra sua vida real e te dá ferramentas práticas para trabalho, sono, relacionamentos e autoconhecimento.

Sem julgamento. Sem promessa de cura. Com R\$47.

Acesse agora: naotaquebrado.com.br

Garantia de 7 dias — se não ajudar, devolvemos 100% do valor.

Este checklist não substitui avaliação profissional. Se você suspeita ter TDAH, procure um psiquiatra ou neuropsicólogo.