


MUSCLEMIND

MEDICIÓN OBJETIVA EN LA ACTIVACIÓN DE MÚSCULOS ESTABILIZADORES EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO



¿Que son los musculos estabilizadores?

Son Aquellos Musculos que no trabajan directamente en el movimiento, ayudan a dar soporte para que los primarios realicen su trabajo de forma eficiente





El "Punto Ciego" del Entrenamiento

En centros de entrenamiento como Dynamic Center, se ha detectado que el enfoque tradicional en músculos grandes (agonistas/antagonistas) ignora a los estabilizadores creando un ciclo de lesiones.

Estadísticas

- En CrossFit, las lesiones musculoesqueléticas alcanzan el **73,5%** entre practicantes con al menos **1,5 años** de experiencia, con una tasa de incidencia de **3,1 lesiones por 1.000 horas de entrenamiento**
- Diferencias de fuerza superior al **15%** entre músculos causadas por fallas en estabilizadores elevan el riesgo de desgarros o esguinces.
- Estos desequilibrios perpetúan un ciclo de lesiones recurrentes, con hasta **7%** de requiriendo cirugía.
- Entrenamientos que fortalecen estabilizadores reducen lesiones hasta en **50%** por sobreuso vía entrenamiento de fuerza.



Causas/Efectos



Normalización del dolor y baja conciencia biomecánica



Aumento de Lesiones, Desgarros, Esguinces y Cirugías



Los entrenadores dependen solo de la vista, existe falta medición objetiva en tiempo real




Los patrones motores incorrectos limitan la capacidad del deportista



Falta de herramientas accesibles de monitoreo en entornos no clínicos.



Altos costos en rehabilitación y ausentismo laboral.



Prevención Basada en Evidencia

- La musculatura estabilizadora del tronco reduce la incidencia de dolor en la espalda baja, que representa el **20%** de las lesiones en practicantes
- Entrenar adecuadamente estabilizadores permite que la energía se transfiera mejor durante el ejercicio, mejorando el desempeño deportivo general
- Una activación correcta del glúteo medio y los estabilizadores isquiotibiales protege zonas críticas como la rodilla y la espalda baja