CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

杨昭春子 项目号:T012110039 性别:女

单　　位:外语教学与研究出版社有限责任公司
联系电话:159****4490　　项目简称:外研社入职
员 工 号:　　类　　别:入职
卡　　号:0010900161237327　　部　　门:入职

递送地址:电子报告
报告递送方式:电子版报告
体 检 号:2020210427136

北京爱康国宾建外门诊部(北京爱康国宾建国门体检分院)

检查日期:2021.04.27

24 / 5515

爱康国宾

爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一,每年为数百万客户提供健康体检、疾病检测、齿科服务和私人医生等服务。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系,爱康国宾为个人及团体提供从体检、检测、医疗、齿科、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务,帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难,为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时,爱康国宾为保险公司以及银行提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案

爱康的体检中心城市(已在官网正式上线展示的城市)包括:北京,上海,广州,深圳,南京,成都,凯里,杭州,苏州,重庆,天津,长春,沈阳,绵阳,烟台,济南,潍坊,威海,青岛,常州,镇江,江阴,无锡,芜湖,宁波,福州,佛山,长沙,武汉,西安,银川,贵阳,毕节。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有　www.ikang.com

尊敬的 杨昭春子 女士：您好！

北京爱康国宾建外门诊部（北京爱康国宾建国门体检分院）感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2021年04月27日的体检报告呈上。

报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。

您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。

因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。

由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

阳性结果和异常情况

【1】 双侧甲状腺肿大？
【2】 脊柱侧弯
【3】 屈光不正
【4】 左眼倒睫
【5】 尿隐血2+

专家建议与指导

【1】双侧甲状腺肿大？：
1、建议到医院内分泌科检查，明确诊断。
2、单纯性甲状腺肿可在医生指导下治疗；肿大明显引起压迫症状或并发甲亢时应及早就诊治疗。
3、保持情绪稳定，避免大的情绪波动。

【2】脊柱侧弯：
建议矫正姿势，观察，必要时到骨科诊治。

【3】屈光不正：
1、凡是裸眼视力低于1.0（含近视、远视、老视、散光等）能够除外其他原因的均称为屈光不正。
2、注意用眼卫生，在乘车、走路或躺着时不要看书。
3、用眼时间稍长可适当闭目休息或做眼保健操和远眺。
4、建议定期检查视力，到正规医院验光，配戴合适的眼镜。

【4】左眼倒睫：
1、常因沙眼，局部炎症，外伤，烧伤等致睫毛囊周围疤痕性收缩，引起睫毛乱生。
2、建议眼科门诊治疗，必要时可手术。

【5】尿隐血2+：
可见于泌尿系感染、体液污染、结石等，建议复查中段尿，必要时专科诊治。

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB
CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

健康体检结果

· 一般项目检查

检查者：王永珍

检查项目	测量结果	单位	异常描述	正常参考值
身高	166.5	cm		
体重	62.9	Kg		
体重指数	22.7			18.5 -- 23.99
收缩压	100	mmHg		90 -- 139
舒张压	70	mmHg		60 -- 89
初步意见	未见明显异常			

· 内科

检查者：李丽娜

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率（次/分）	67	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

· 外科

检查者：蔡立娜

检查项目	检查所见	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	未见明显异常	
甲状腺(外科)	甲状腺双侧Ⅰ度肿大	
乳房	未见明显异常	
脊柱	脊柱侧弯	

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

四肢关节	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	未见明显异常	
外科其它	无	
初步意见	双侧甲状腺肿大(？) 脊柱侧弯	

· 眼科

检查者：米惠萍

检查项目	检查所见	单位
矫正视力(右)	1.2	
矫正视力(左)	1.5	
色觉	正常	
外眼	左眼下睑缘向内卷曲、睫毛倒向眼球	
眼科其它	无	
初步意见	屈光不正 左眼倒睫	

· 血常规

操作者：姜丽梅 审核者：张玉梅

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	8.30		3.5 -- 9.5	10^9/L
红细胞计数	RBC	4.87		3.80 -- 5.10	10^12/L
血红蛋白	Hb	139.00		115 -- 150	g/L
红细胞比容	HCT	0.40		0.35 -- 0.45	%
平均红细胞体积	MCV	82.00		82.0 -- 100.0	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	28.50		27 -- 34	Pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	349.00		316 -- 354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	14.50		10 -- 15	%
血小板计数	PLT	205.00		125 -- 350	10^9/L
平均血小板体积	MPV	9.70		9 -- 13	fL
血小板分布宽度	PDW	13.50		9 -- 17	fL
淋巴细胞百分比	LYMPH%	27.10		20 -- 50	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	62.80		40 -- 75	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	2.26		1.1 -- 3.2	10^9/L
中性粒细胞绝对值	NEUT	5.24		1.8 -- 6.3	10^9/L
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	42.0		37 -- 50	fL

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

血小板压积	PCT	0.20		0.1 -- 0.3	%
单核细胞百分比	MONO%	6.70		3.5 -- 9.5	%
单核细胞绝对值	MONO	0.56		0.1 -- 0.6	10^9/L
嗜酸性细胞百分比	EOS%	3.30		0.0 -- 8.0	%
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.28		0.02 -- 0.52	10^9/L
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.10		0 -- 1	%
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.01		0.00 -- 0.06	10^9/L
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

· 尿常规

操作者：姜丽梅 审核者：赵晓春

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.020		1.005 -- 1.030	
尿酸碱度	PH	6.0		4.5 -- 8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	
尿糖	GLU	阴性		阴性	
尿酮体	KET	阴性		阴性	
尿胆原	URO	阴性		阴性	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	
尿隐血	BLD	2+	↑	阴性	
尿镜检红细胞	RBC	0-1		0 -- 3	/HP
尿镜检白细胞	WBC	0		0 -- 5	/HP
管型	CAST	0		0 -- 1	
上皮细胞	EC	0		0 -- 5	/HP
无机盐类		0			
小结	尿隐血阳性				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

· 实验室检查

操作者：黄艳玲 审核者：曹蕊

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	14		0 -- 40	U/L
肌酐	Cr	52		35 -- 106	umol/L
空腹血葡萄糖	FBG	5.45		3.9 -- 6.1	mmol/L
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

· 心电图室

检查者：赵先树

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律 正常心电图	
初步意见	未见明显异常	

· 超声检查室

检查者：刘戈平

检查项目	检查所见	单位
肝	未见明显异常	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	未见明显异常	
初步意见	未见明显异常	

主检医师：

医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

什么是单纯性甲状腺肿？

绝对或相对性缺碘或者因甲状腺激素合成障碍而引起的代偿性甲状腺肿大。可分为地方性和散发

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB
CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

性两种，前者发生于缺碘地区。本病好发于青年女性，甲状腺呈弥漫性或结节性肿大，一般无自觉症状，甲状腺功能正常。

什么是屈光不正？

在调节松弛的状态下，正视状态的眼球（正常屈光），入射光线经过角膜、晶状体后聚焦于视网膜表面，形成清晰的图像传入大脑。晶状体具有弹性，年轻人的弹性更好。调节时，睫状肌调整晶状体形状以更好的聚焦影像。屈光不正是指眼在调节松弛的状态下，平行光线经过眼的屈光系统屈折后，不能把光线聚焦成清晰的图像在视网膜上，而成像于视网膜前或后，造成眼视物模糊。屈光不正包括远视、近视和散光。屈光不正的主要症状为视远和（或）视近时视物模糊。有时候，睫状肌张力过高可能引起头痛症状。偶尔，长时间注视可能导致眼表面干燥，引起眼部刺激症状、眼痒、视觉疲劳、异物感和眼红。儿童表现为阅读时皱眉和过度眨眼或者揉眼。矫治近视眼需配戴合适度数的凹透镜，使平行光线在进入眼以前发散，经眼屈光系统后聚焦于视网膜上。同理，矫治远视眼需配戴合适度数的凸透镜，矫治散光需配戴柱镜或球柱镜。散光眼即使度数很轻，若有视力下降，或出现视疲劳症状者，都应当配戴矫正眼镜。对于高度散光眼或不规则散光眼，当镜片无法矫治时可以考虑配戴硬性接触镜或行准分子激光手术治疗。

什么是沙眼？

是由衣原体引起的常见慢性传染病。其特点为睑结合膜炎症有滤泡形成，乳头肥大和角膜血管翳形成。临床症状有发痒、异物感、畏光，流泪及眼疲劳等。严重病人可并发睑内翻、倒睫等而损伤角膜，甚至影响视力。其传播方式主要经手及其他生活用品传播。因此，本病的防治措施应以加强个人卫生及公共卫生为主，实行普查普治。

什么是倒睫？

倒睫是指睫毛向后生长，乱睫是指睫毛不规则生长。两者都可致睫毛触及眼球。可引起眼睑内翻的各种原因均能造成倒睫，其中以沙眼最为常见。眼睑瘢痕、毛囊变形、慢性睑缘炎、眼睑外伤、结膜瘢痕性病变都能产生倒睫或乱睫。患者常有慢性眼部刺激和炎症病史，倒睫多少不一，有时仅1～2根，有时一部分或全部睫毛向后摩擦角膜，患者常有眼痛、流泪和异物感。由于睫毛长期摩擦眼球，导致结膜充血、角膜浅层混浊、新生血管、角膜上皮角化、角膜溃疡等。

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

CFEB2A20E09BABEEF92B857865D94BF3F360BEE7FBD91830DE60D73708CD35DB

iKang 爱康
扫码下载爱康APP
想第一时间看到体检报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理！
约体检 查报告 历史数据对比 专家解读 三甲医院挂号
iKangCare+，有人“管”的体检！