



## Tabla completa – Sedoanalgesia y bloqueo neuromuscular

	RAM
Intermitente: NO EV continua: SI IM: SI Otras vías: NO	Reacciones
Intermitente: NO EV continua: SI IM: SI Otras vías: V.O., V.R	Hipotensión, vasodilatación estreñimiento, diarrea, náuseas, cambios en la salivación, flebitis,
Intermitente: SI EV continua: SI IM: SI Otras vías: parche intradermico	Depresión
Intermitente: NO EV continua: SI IM: NO Otras vías: NO	Náuseas, vómitos, vértigo, ansiedad, depresión moderada, agitación, palpitaciones, bradicardia
SI EV intermitente: SI EV continua: SI	Reacciones extrapiramidales, euforia, letargia, insomnio, taquicardia, galactorrea Puede generar confusión
SI EV intermitente: SI EV continua: SI	Confusión, alucinaciones, delirium, náuseas vómitos, cambios en las enzimas hepáticas. Para el dolor:
	La administración directa (en bolo) puede provocar flebitis y dolor en sitio de inyección, es mejor diluir en suero.
	30mg de ketorolaco equivalen a 12 mg de morfina o meperidina. Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal.
Intermitente: no EV continua: si IM: SI Otras vías: V.O.	Se puede producir paro cardiaco, hipotensión, bradicardia, colapso cardiovascular, confusión, convulsiones.
	Se puede administrar la ampolla de metamizol EV vía oral para manejar el dolor 1-3 g/ 8 Hrs
	El antagonista es el Flumazenil.
Intermitente: NO EV continua: SI IM: SI Otras vías: S.C.	constipación, retención urinaria, somnolencia, mareos, sedación, náuseas, vómitos, sudoración excesiva.
Intermitente: NO EV continua: SI IM: SI Otras vías: S.C., intraoseo	Se puede observar convulsiones después de la administración de naloxona (no es muy común).
Intermitente: SI EV continua: SI IM: SI Otras vías: S.C.	náuseas, vómitos, mareos, palpitación, bradicardia y prurito. Produce menos constipación y retención urinaria.
Intermitente: NO EV continua: SI IM: NO Otras vías: NO	Se puede observar bradicardia, hipotensión, movimientos, ardor, dolor o prurito en el sitio de inyección.
Intermitente: NO EV continua: SI (no recomendado) IM: SI Otras vías: NO	Arritmias, bradicardia, hipo/hipertensión, taquicardia, rash, hiperpotasemia, salivación, fasciculaciones.