

Tabla de administración de medicamentos antimicrobianos endovenosos

Declaración: Esta tabla ha sido elaborada para facilitar la reconstitución, dilución, administración y estabilidad de los antimicrobianos más utilizados, según literatura consultada. Los autores han realizado un esfuerzo para asegurar la información, sin embargo, el contenido puede estar sujeto a modificación según cada proveedor.

Elaborado: EU Juan Mora Castillo- QF Pamela Muñoz Vargas - QF Valentina Córdoba.

Nombre de medicamento	Reconstitución	Dilución (concentración máxima)	Velocidad de administración/ tiempo de infusión	Estabilidad Físico-química	pH	Osmolaridad	Riesgo de daño local ²
Aciclovir 250 mg Aciclovir 500 mg	Solvente incluido en envase o • Aciclovir 250 mg:10 mL • Aciclovir 500 mg:20 mL SF0.9% o SG5%	100 mL SF0.9% o SG5% No exceder 5 mg/mL	1 h	TA: 24 h	10,5-11,6	316 – 319 ¹	Alto
Amikacina 100 mg Amikacina 500 mg	No requiere solvente	100 - 200 mL SF0.9% – SG 5%	30-60 min	TA: 24 h	3,5-5,5	349	Moderado
Ampicilina 500 mg	Agua para inyectable 5 mL para 500 mg	50 mL - 100 mL SF0.9% No exceder 30 mg/mL	Bolo: 10- 15 min IV: 30-60 min No exceder 100 mg/min	TA: 8 h	8-10	372- 620	Alto
Ampicilina/sulbactam 1000 mg / 500 mg	Agua para inyectable	50 mL - 100 mL SF0.9%	Bolo: 10- 15 min Infusión IV: 15-30 min	RE: 24 h	8-10	400	Alto
Anfotericina b DESOXICOLATO 50 mg (convencional)	10 mL Agua para inyectable	500 mL SG5% Vía Periférica: 0,1 mg/mL Vía Central: 0,25-0,5 mg/mL	2-6 h	Utilizar una vez diluido y proteger de la luz.	5,0-6,0	256	Bajo

Anfotericina b 50 mg LIPOSOMAL	12 mL Agua para inyectable (4mg/mL)	25- 250 mL SG5% (0,2 – 2 mg/mL)	30-60 min	No disponible	No disponible	280	Bajo
Anidulafungina 100 mg	30 mL Agua para inyectable	100 mL SG5% o SF 0.9% No exceder 0,77 mg/mL	90 min, no exceder 1,1 mg/min	RE: 24 h	3,5-5,5	No disponible	Bajo
Caspofungina 70 mg Caspofungina 50 mg	10,5 mL Agua para inyectable o SF0.9%	250 mL SF0.9%	Infusión IV prolongada durante 60 min	Reconstitución TA: 1 h Diluido: 48 h entre 2-8 °C	6,6	309	Bajo
Cefazolina 1 gr	2,5 mL Agua para inyectables	IV Directo: 5 mL SF0.9% SG5% 50-100 mL SF0.9%, SG5%	IV Directo: 5 min 30-60 min	TA: 24 h	4,5-7	317-351	Bajo
Cefepime 1 g	10 mL Agua para inyectables	50-100 mL SF0.9%, SG5%	IV: 30 mi	TA: 12 h RE: 24 h	4-6	307	Bajo
Cefotaxima 1g	4 mL Agua para inyectables	50 mL– 100 mL SF0.9%, SG5%	IV:15-60 min	TA: 24 h RE: 7-10 días	5-7,5	344-357	Bajo

Ceftazidima 1 g	10 mL Agua para inyectables	25 -100 mL SF0.9%, SG5%	IV :30-60 min	TA: 24 h RE: 7 días	5 -8	240-330	Bajo
Ceftazidima/Avibactam 2 g /0.5 g	10 mL Agua para inyectables	50-250 mL SF0.9%, SG5%	IV:120 min	TA: 30 min	6.73	386	Bajo
Ceftriaxona 1g	10 mL Agua para inyectables	25-100 mL SF0.9%, SG5% (no exceder los 40mg/mL)	IV: 30 min	TA: 24 h	6,6-6,7	350	Bajo
Ciprofloxacino 200 mg	No procede	No procede	IV 200 mg: 60 min IV 400 mg: 120 min	No disponible	3,3-4,6	285	Moderado
Clindamicina 600 mg	No procede	300 mg - 600 mg en 50 mL 900 mg: 50-100 mL 1200 mg: 100 mL SG5%	IV: 300 mg:10 min 600 mg:20 min 900 mg: 30 min 1200 mg: 60 min No exceder 30 mg/min	TA: 24 h	6,3 (5,5 - 7,0)	294	Bajo
Cloxacilina 500 mg	10 mL Agua para inyectables	50-100 mL SG5%, SF0.9%	Bolo durante 3-5 min IV: 30-60 min	Administrar Inmediatamente	8-10	368	Moderado

COLISTIN Colistimetato de sodio 240 mg = 100 mg Colistin 3 millones UI de colistina base	2 mL Agua para inyectables	100 mL SF0.9%, SG5%	IV: 30 min - 1 hora	Administrar Inmediatamente	6,5-8,5	294-310	Bajo
Daptomicina 500 mg	10 mL SF 0.9%	50 mL SF0.9%	IV: 30 min.	TA: 12 h Ref.: 24 h	4-5	289-310	Moderado
Eritromicina 1g lactobionato	20 mL Agua para inyectables	200 -1000 mL SF0.9% (1-5 mg/mL)	IV: 20-60 min	TA: 8 h Ref.: 24 h	7 (6,5-7,7)	291	Bajo
Ertapenem 1 gr	10 mL Agua para inyectables	50 mL SF0.9% (20 mg/mL)	IV: 30 min	TA: 6 h RE.: 24 h	7,5	419	Bajo
Fluconazol 400 mg/200 mL	No procede	No procede	IV: 120 min	Uso inmediato	4-8	315	Moderado
Ganciclovir 500 mg	10 mL Agua para inyectables	100 - 250 mL SF0.9%, SG 5%. No exceder 10 mg/mL	IV: mínimo en 60 min	RE: 7 días 1-10 mg/mL en	11	320	Alto

				SF 0,9 % o SG 5 %			
Gentamicina 80 mg	No procede	50-200 mL SF0.9% SG5% No exceder 1 mg/mL	IV: 30-60 min	TA: 24 h	3-5	280-290	Moderado
Imipenem cilastatina 500 mg	10 mL SF 0.9%, SG5%	500 mg en 100 mL 0.9% SG5% (5 mg/mL)	IV: 4 h	TA:4 h SG5% TA:10 h SF0.9%	6,5-8,5	368	Moderado
Isoniazida 300 mg	5 mL Agua para inyectable	20-50 mL SF0.9%, SG5%	Bolo: 10-15 min IV: 60 min	No disponible	No disponible	No disponible	Riesgo alto
Levofloxacin 500 mg	No procede	No procede	IV 500 mg: 60 min ⁴ IV 750 mg: 90 min	Uso inmediato	3,8-5,8	250	Bajo
Linezolid 600 mg/300 mL	No procede	No procede	IV: 30-120 min	Uso inmediato	4,8	290	Moderado

Metronidazol 500 mg/100 mL	No procede	No procede	IV: 30-60 min	Uso inmediato	5-7,0	310	Moderado
Meropenem 500 mg, 1000 mg	10-20 mL Agua para inyectables	500 mg en 100 mL ⁹ SF 0.9% 1 g en 200 mL SF 0.9% (5 -50 mg/mL)	IV: 15-30 min SG5% IV: 1-3 h SF 0.9%	Inmediatamente SG5% 1-3 h en SF 0.9%	7,3-8,3	300	Bajo
Penicilina sódica 1 millón y 2 millones UI	5 mL Agua para inyectables	50-1000 mL SF0.9% (100 millón UI/mL)	IV directa: 5 min IV:15-30 min	TA: 24 h	6-8,5	420	Moderado
Piperacilina-tazobactam 4.5 g	20 mL SF 0.9% Agua para inyectables	50-100 mL SG 5%	4 h	TA: 12 h	5,1-5,4	445	Moderado
Rifampicina 600 mg	10 mL Agua para inyectables	100 mL SF0.9%, SG5% 500 mL SF0.9%, SG5% (VVP) No exceda 6 mg/mL	CVC: 30 min VVP: 2-3 h	TA:6 h SF 0.9% TA: 8 h SG5%	No disponible	No disponible	Riesgo alto
Sulfametoxazol-Trimetoprim 400/80 MG AM (5 ML)	No procede	SF0.9% SG5% 1 AM (5ML): 125 mL 2 AM (10 ML): 250 mL 3 AM (15ML):500 mL	IV: 30-90 min	TA: 6 h	10	541	Alto

Tigeciclina 50 mg	5.3 mL SF 0.9%, SG 5%	100 mL SF 0.9%, SG 5%	IV: 30-60 min	TA: 6 h	5,3	270-281	Bajo
Vancomicina 500 mg 1000 mg	20 mL Agua para inyectables	1 g en 100-200 mL SF 0.9%, SG 5% No exceder 5 mg/mL Restricción volumen: 10mg/mL	No exceder 10mg/min	RE: 24 h	2,5-4,5	290	Alto
Voriconazol 200 mg	20 mL Agua para inyectables	100-250 mL SF 0.9%, SG5%	IV: 60-120 min (3 mg/kg/h)	RE: 24 h	6-7	No disponible	Medio

SF 0.9%: suero fisiológico 0.9%, SG5%: suero glucosado 5%, RE: Refrigerado, TA: temperatura ambiente 25°C. h: hora, min: minutos. * según proveedor. IV: intravenoso.
CVC: catéter venoso central. VVP: vía venosa periférica.

Riego de daño según osmolaridad (mOsm/L) y pH: Alto: ≥ 500 , pH < 5, pH > 9. Moderado: > 350 y ≤ 499 . Bajo: < 350

- Para **Riesgo alto** considerar la utilización de un catéter Midline largo
- Para **Riesgo moderado** considerar la utilización de Catéter Midline largo o corto, además evaluar la cantidad de días que estará con el tratamiento.
- Para **Riesgo bajo** considerar la utilización de catéter venoso periférico corto o un catéter periférico con sistema integrado (NEXIVA), evaluar el tiempo de duración del tratamiento.

Considerar los 10 correctos

- Medicamento correcto
- Paciente correcto
- Dosis correcta
- Hora correcta
- Registro correcto
- Vía de administración
- Preparar usted mismo el medicamento
- Administrar usted mismo el medicamento
- Tener responsabilidad de la administración
- Razón correcta

Referencias:

1. Folleto de información al paciente Aciclovir 250 mg. AEMPS
2. Prevención de complicaciones relacionadas con accesos vasculares de inserción periférica. Programa flebitis zero. AEMPS Madrid 2019 disponible www.aemps.gov.es [revisado marzo -mayo 2024]
3. UpToDate [revisado marzo -mayo 2024]
4. Medscape [revisado marzo -mayo 2024]
5. M.Maqueda Palau,E. PérezJuan. Seguridad del paciente en la administración de antibióticos: evaluación del riesgo. Rev.Calid.Asist.2017;32(3):178---186
6. Tabla de Osmolaridades y pH. BD. Referencia de INS; Infusion Nurses Society: (2021) Noncytotoxic Vesicant Medication on the ONS Learning Center Tab.
7. InfoStab. [Internet] disponible en www.stabilis.org [revisado marzo -mayo 2024]
8. Hospital regional de Málaga [revisado marzo -mayo 2024]
9. Listado de Fármacos y Árbol de accesos vasculares. Manual GAVeCeLT sobre PICC y MIDLINE 2016.Vygon España.
10. Lexicomp. [revisado marzo -mayo 2024]
11. Proanet. Sociedades Latinoamericanas de Infectología [revisado marzo -mayo 2024]
12. AntibioticAPP. Sociedad Argentina de Terapia Intensiva e Infectología [revisado marzo -mayo 2024]
13. Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca [revisado marzo -mayo 2024]
14. Injectable Drugs Guide [revisado marzo -mayo 2024]
15. Folleto de información al paciente PiSA
16. Folleto de información al paciente UNIFARMA
17. Folleto de información al paciente RICHET
18. Folleto de información al paciente Pfizer