

Curso libre:
Econometría en Python

Monitor encargado:
*Juan Felipe Acevedo
Pérez*

Correo: uniic_bog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext 12301

Series de tiempo

Juan Felipe Acevedo Pérez
Monitor (a) Unidad de Informática

Series de tiempo

Correo: uniic_bog@unal.edu.co


Teléfono: 3165000 ext 12301

Series de tiempo

- Secuencia de datos ordenados cronológicamente.
- A diferencia de los datos de corte transversal, **sí** existe un orden natural para las observaciones.
- Uso en pronóstico.

ARIMA

- ¿Variables explicativas? ... La misma regresada.
- Correlación entre observaciones.
- Modelos ateóricos (Gujarati y Porter, 2010)
- Metodología Box-Jenkins.
- ARIMA:
 - AR = Autoregressive
 - I = Integrated
 - MA = Moving Average



AR(p)

- Las variables explicativas corresponden a los valores rezagados, hasta p periodos, de la variable explicada.

$$Y_t = c + \alpha_1 Y_{t-1} + \alpha_2 Y_{t-2} + \cdots + \alpha_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

MA(q)

- Las variables explicativas corresponden a términos de error estocásticos de ruido blanco acumulados hasta por q periodos.

$$Y_t = c + \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1} + \theta_2\varepsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q\varepsilon_{t-q}$$

ARMA (p,q)

- Corresponde a combinación de AR(p) y MA(q)

$$Y_t = c + \sum_{i=1}^p \alpha_i Y_{t-i} + \sum_{i=0}^q \theta_i \varepsilon_{t-i}$$

ARIMA(p,d,q)

- Los modelos ARMA se construyen sobre el supuesto de que la serie a modelar es estacionaria (débilmente).
- Si la serie no es estacionaria debe ser transformada para poder modelarla.
- Una serie se dice $I(d)$ si tras ser diferenciada d veces se obtiene una serie estacionaria.
- Un ARIMA(p,d,q) de la serie original es equivalente a un ARMA(p,q) de la serie transformada (diferenciada d veces)

Serie estacionaria

- Una serie se dice (débilmente) estacionaria si:
 - $E[Y_t] = \mu \quad \forall t$
 - $Var(Y_t) = \sigma^2 \quad \forall t$
 - $Cov(Y_t, Y_{t+h}) = Cov(Y_{(t+k)}, Y_{(t+k)+h}) = \gamma_h$
 - La covarianza depende únicamente de la distancia.

Metodología Box-Jenkins

- La metodología Box-Jenkins, de acuerdo a Gujarati y Porter (2010), comprende 4 fases:
 - Identificación
 - Estimación
 - Examen de diagnóstico
 - Pronóstico

Identificación

- Determinar si la serie es estacionaria:
 - Función de Autocorrelación Simple y de Autocorrelación Parcial.
 - Test de Dickey-Fuller Aumentado
- Transformar la serie original hasta obtener una estacionaria.
- Selección de parámetros (p,d,q)

Estimación

- Estimación de coeficientes de acuerdo a lineamientos establecidos para el modelo.

Verificación de diagnóstico

- ¿Qué tan razonable es el ajuste?
- ¿Los residuos son puramente aleatorios?
 - Función de Autocorrelación Simple y de Autocorrelación Parcial.
 - Test Ljung-Box, Box-Pierce.

Pronóstico

- Predicción realizada por el modelo.
- Comparar con datos reales.
- ¿Subestimación? ¿sobrestimación?

Referencias

- Gujarati, D.N. y Porter, D.C. (2010). Econometría. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.