

Escala SNAP-IV, versión argentina

SNAP-IV

Nombre	Fecha	Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Detectar síntomas de inatención y de hiperactividad e impulsividad en niños de 4 a 14 años, a partir de los criterios diagnósticos del TDAH, según lo que observa el docente o la familia. Es una herramienta de tamizaje: un puntaje sobre el corte pide una evaluación diagnóstica, no la reemplaza.

CÓMO SE APLICA

1. La responde el docente (los cortes se validaron con docentes) o uno de los padres, pensando en cómo se comporta el niño habitualmente.
2. Nada vale 0, Poco 1, Bastante 2 y Mucho 3. Se suman las preguntas 1 a 9 (inatención) y 11 a 19 (hiperactividad e impulsividad), de 0 a 27 cada una. Las preguntas 10 y 20 son generales y no entran en la suma.
3. Si se divide cada suma entre 9 se obtiene el índice que usan los artículos (de 0 a 3).

Lea cada frase anteponiendo «A menudo...» y marque cuánto describe al niño o la niña.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
1. Le cuesta prestar atención a detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares o trabajo.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
2. Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
3. Parece no escuchar cuando se le habla directamente.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
4. Le cuesta seguir instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
5. Tiene dificultad en organizar sus tareas y actividades.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
6. Evita, le disgusta o es reacio a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
7. Extravía objetos necesarios para realizar sus actividades (p. ej. juguetes, ejercicios escolares, lápices o libros).	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
8. Se distrae por estímulos irrelevantes de su tarea.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
9. Es descuidado en sus actividades diarias.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
10. Le cuesta mantenerse alerta, responder a lo que se le pide, o ejecutar consignas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
11. Mueve las manos y los pies o se retuerce en el asiento.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
12. Abandona su asiento en clase u otras situaciones en que se espera que permanezca sentado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
13. Corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
14. Tiene dificultades para jugar o dedicarse a actividades de ocio tranquilamente.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
15. Está «en marcha» o actúa como si tuviera un motor encendido.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
16. Habla en exceso.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
17. Precipita respuestas antes de haber sido terminadas las preguntas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Escala SNAP-IV, versión argentina (continuación)

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
18. Tiene dificultades para aguardar su turno.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
19. Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej. se entromete en conversaciones o juegos).	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
20. Tiene dificultad para permanecer sentado, quedarse quieto o inhibir impulsos en la clase o en el hogar.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Inatención, 1 a 9 (0 a 27)

Hiperactividad, 11 a 19 (0 a 27)

Respondió

Puntos de corte de la versión argentina (forma para docentes)

Subescala	Corte	Sensibilidad y especificidad
Inatención	15 o más (índice 1,66)	72,7 % y 65,3 %
Hiperactividad e impulsividad	16 o más (índice 1,77)	86,4 % y 73,5 %

Los cortes se obtuvieron con la forma que responden los docentes, en niños de 4 a 14 años del Gran Buenos Aires; los autores la prefirieron porque en población latina los padres suelen puntuar más alto. Con la forma de los padres, use los cortes como referencia aproximada. Un puntaje sobre el corte orienta la evaluación diagnóstica: el SNAP-IV no basta por sí solo para diagnosticar TDAH.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Swanson, J. M., Nolan, W. y Pelham, W. E. SNAP-IV Rating Scale · Versión argentina: Grañana, N., Richaudeau, A., Robles Gorriti, C., O'Flaherty, M., Scotti, M. E., Sixto, L., Allegri, R. y Fejerman, N. (2011). Evaluación de déficit de atención con hiperactividad: la escala SNAP IV adaptada a la Argentina. Revista Panamericana de Salud Pública, 29(5), 344–349, cuadros 1 y 3. El SNAP-IV es de dominio público. El texto se toma del cuadro 1 de la adaptación argentina, publicada en acceso abierto por la Organización Panamericana de la Salud; la consigna es de esta guía.