

Escala del Trastorno de Ansiedad Generalizada

GAD-7

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar síntomas de ansiedad de las dos últimas semanas y estimar su gravedad. Se diseñó para el trastorno de ansiedad generalizada, pero también detecta con razonable precisión el pánico, la ansiedad social y el estrés postraumático. No diagnostica ni distingue entre ellos.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola; si no puede leer, se le leen los ítems tal como están escritos.
2. Se suman los valores marcados en los siete ítems (0 a 21).
3. Un puntaje de 10 o más pide una entrevista clínica para precisar de qué trastorno de ansiedad se trata.

Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido molestias por los siguientes problemas?

	Para nada	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días
1. Sentirse nervioso/a, ansioso/a, o con los nervios de punta	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
2. No poder dejar de preocuparse o no poder controlar la preocupación	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
3. Preocuparse demasiado por diferentes cosas	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
4. Dificultad para relajarse	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
5. Estar tan inquieto/a que es difícil permanecer sentado/a tranquilo/a	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
6. Molestarse o irritarse fácilmente	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
7. Sentir miedo como si algo terrible pudiera pasar	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Puntaje total (0 a 21)

Gravedad

Calificación e interpretación

Puntaje	Gravedad de los síntomas	Qué sugiere hacer
0 a 4	Mínima	Sin indicación de tratamiento por este puntaje.
5 a 9	Leve	Seguimiento y psicoeducación; repetir en la siguiente cita.
10 a 14	Moderada	Punto de corte habitual: entrevista clínica para precisar el trastorno.
15 a 21	Grave	Tratamiento activo.