

Cuestionario sobre la Salud del Paciente-9

PHQ-9

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar síntomas depresivos de las dos últimas semanas y estimar su gravedad. Cada ítem corresponde a un criterio del episodio depresivo mayor, así que sirve también para seguir el cambio sesión a sesión. No diagnóstica: un puntaje alto pide una entrevista clínica.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola; si no puede leer, se le leen los ítems tal como están escritos, sin explicarlos con otras palabras.
2. Se suman los valores marcados en los nueve ítems (0 a 27). La pregunta de dificultad no suma: indica cuánto interfieren los síntomas.
3. Revise el ítem 9 antes que el total: cualquier respuesta distinta de «Para nada» obliga a valorar el riesgo suicida en la misma consulta.

Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido molestias por los siguientes problemas?

	Para nada	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días
1. Poco interés o placer en hacer las cosas	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
2. Sentirse desanimado/a, deprimido/a o sin esperanzas	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
3. Problemas para dormir o mantenerse el sueño o dormir demasiado	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
4. Sentirse cansado/a o con poca energía	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
5. Sentir poco apetito o comer en exceso	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
6. Sentirse mal acerca de sí mismo o tener un sentimiento de fracaso o de abandono propio o de la familia	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
7. Dificultad para concentrarse en diferentes actividades tales como leer el periódico o ver televisión	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
8. Moverse o hablar tan despacio que otras personas lo han notado o bien, por el contrario, estar tan inquieto/a o intranquilo/a que se mueve mucho más de lo normal	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
9. Pensamientos acerca de que sería mejor estar muerto/a o deseos de lastimarse de alguna forma	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Si marcó cualquier problema, ¿qué grado de dificultad le generaron estos problemas para realizar su trabajo, encargarse de las tareas domésticas o relacionarse con otras personas?

☐ No ha sido difícil ☐ Algo difícil ☐ Muy difícil ☐ Extremadamente difícil

Puntaje total (0 a 27)

Ítem 9 (0 a 3)

Gravedad

Cuestionario sobre la Salud del Paciente-9 (continuación)

Calificación e interpretación

Puntaje	Gravedad de los síntomas	Qué sugiere hacer
0 a 4	Mínima	Sin indicación de tratamiento por este puntaje.
5 a 9	Leve	Seguimiento; repetir el cuestionario en la siguiente cita.
10 a 14	Moderada	Punto de corte habitual para depresión probable: entrevista clínica y plan de tratamiento.
15 a 19	Moderadamente grave	Tratamiento activo: psicoterapia, y valoración médica para farmacoterapia.
20 a 27	Grave	Tratamiento activo e inmediato, y valoración por psiquiatría.

El ítem 9 no distingue entre desear estar muerto y planear hacerse daño: un valor mayor que 0 no es un diagnóstico de riesgo, pero sí la señal para preguntar directamente. Para esa entrevista, vea la ficha técnica de la C-SSRS o el ASQ en la guía de tamizaje.