

Inventario de Depresión de Beck, segunda edición

BDI-II

PARA QUÉ SIRVE

Medir la gravedad de los síntomas depresivos en adolescentes y adultos, con puntos de corte establecidos. Es una de las medidas más usadas en la investigación de la depresión y en la evaluación antes y después de un tratamiento.

ANTES DE USARLO

1. Sus ítems están protegidos por derechos de autor: no se fotocopian ni se reescriben. Se aplican con los protocolos originales comprados al editor.
2. Su uso está restringido a profesionales en psicología; el manual trae las normas de aplicación y calificación.
3. Si no se cuenta con el instrumento, use la alternativa libre que aparece al final.

Qué mide

Gravedad de los síntomas depresivos durante las dos últimas semanas, incluido el día de la aplicación. Sus contenidos siguen los criterios del episodio depresivo mayor del DSM-IV: tristeza, pérdida de placer, pesimismo, culpa, cambios del sueño y del apetito, fatiga, ideación suicida, entre otros.

Población

Adolescentes desde los 13 años y adultos.

Formato

21 grupos de afirmaciones. En cada grupo la persona elige la que mejor describe cómo se ha sentido, con valores de 0 a 3. Los grupos de sueño y de apetito distinguen además aumento o disminución.

Aplicación

Autoaplicado, de 5 a 10 minutos. Puede leerse en voz alta a quien tenga dificultad para leer.

Calificación

Suma de los 21 grupos, de 0 a 63.

Punto de atención

El grupo sobre pensamientos o deseos suicidas se revisa siempre, sea cual sea el total: cualquier respuesta distinta de la primera pide valorar el riesgo en la misma sesión.

Cómo se consigue

Se compra a Pearson (manual y protocolos). En Colombia se consigue a través de los distribuidores de pruebas psicológicas autorizados por el editor.

Interpretación publicada en el manual

Puntaje	Gravedad
0 a 13	Mínima
14 a 19	Leve
20 a 28	Moderada
29 a 63	Grave

ALTERNATIVA DE ACCESO LIBRE

PHQ-9 (Cuestionario sobre la Salud del Paciente-9): nueve ítems sobre las mismas dos semanas, con puntos de corte de gravedad publicados y un ítem de ideación suicida. Es de libre reproducción y tiene versión oficial en español para Colombia. Su ficha completa está en la guía de tamizaje.

Esta ficha no reproduce ni parafrasea los ítems del BDI-II. Resume datos publicados sobre el instrumento para orientar su elección.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Beck, A. T., Steer, R. A. y Brown, G. K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation. Adaptación española: Sanz, J. y Vázquez, C. (2011). BDI-II. Inventario de Depresión de Beck-II. Madrid: Pearson.