

Inventario Obsesivo-Compulsivo Revisado

OCI-R

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir la gravedad de los síntomas obsesivo-compulsivos y su tipo: lavado, comprobación, orden, acumulación, neutralización (contar, números) y obsesiones. Es breve y sirve para tamizar y para seguir el tratamiento.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola, marcando cuánto malestar le ha producido cada experiencia durante el último mes.
2. Cada ítem vale de 0 (en absoluto) a 4 (muchísimo). El total suma los 18 (0 a 72); cada subescala suma sus tres ítems (0 a 12).

Marca una opción por ítem según la siguiente escala:

	En absoluto	Un poco	Bastante	Mucho	Muchísimo
1. Acumular cosas hasta el punto que le estorban.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
2. Comprobar las cosas más a menudo de lo necesario.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
3. Que las cosas no estén bien ordenadas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
4. Sentir la necesidad de contar mientras está haciendo cosas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
5. Tocar un objeto cuando sabe que lo han tocado desconocidos o ciertas personas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
6. No poder controlar sus propios pensamientos.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
7. Acumular cosas que no necesita.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
8. Comprobar repetidamente puertas, ventanas, cajones...	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
9. Que los demás cambien la manera en que ha ordenado las cosas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
10. Tener necesidad de repetir ciertos números.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
11. Tener a veces que asearse o lavarse por el mero hecho de sentirse contaminado/a.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
12. Tener pensamientos desagradables en contra de su voluntad.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
13. Sentirse incapaz de tirar cosas por temor a necesitarlas después.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
14. Comprobar repetidamente el gas, el agua y la luz después de haberlos cerrado/apagado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
15. Tener la necesidad de que las cosas estén ordenadas de una determinada manera.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
16. Sentir que existen números buenos y malos.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
17. Lavarse las manos más a menudo y durante más tiempo de lo necesario.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
18. Tener con frecuencia pensamientos repugnantes y que le cueste librarse de ellos.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Total (0 a 72)

Subescala más alta

Inventario Obsesivo-Compulsivo Revisado (continuación)

Subescalas (0 a 12 cada una)

Subescala	Ítems	Qué recoge
Lavado	5, 11, 17	Contaminación y lavado excesivo.
Comprobación	2, 8, 14	Comprobar puertas, llaves, gas, luz.
Orden	3, 9, 15	Necesidad de orden y simetría.
Acumulación	1, 7, 13	Dificultad para deshacerse de cosas.
Neutralización	4, 10, 16	Contar, números buenos y malos.
Obsesión	6, 12, 18	Pensamientos intrusivos desagradables.
Total 21 o más	Los 18	Probable trastorno obsesivo-compulsivo (corte del estudio original).

El corte de 21 es el de Foa et al. (2002) y orienta la entrevista: no basta para diagnosticar. Las subescalas no tienen cortes validados; sirven para ver qué tipo de síntomas predomina.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., Langner, R., Kichic, R., Hajcak, G. y Salkovskis, P. M. (2002). The Obsessive-Compulsive Inventory: Development and validation of a short version. *Psychological Assessment*, 14(4), 485–496 · Versión española en población clínica: Belloch, A., Roncero, M., García-Soriano, G., Carrió, C., Cabedo, E. y Fernández-Álvarez, H. (2013). The Spanish version of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R). *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 2, 249–256. El permiso de reproducción está por confirmar. Se reproduce con la copia del docente.