

Preguntas de Detección del Riesgo de Suicidio

ASQ

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Detectar en menos de un minuto el riesgo de suicidio en cualquier consulta, incluso cuando el motivo no es de salud mental. Cuatro preguntas directas y, si alguna es positiva, una quinta que separa el riesgo agudo del no agudo.

CÓMO SE APLICA

1. Haga las preguntas tal como están escritas, en privado y sin rodeos: preguntar por el suicidio no lo induce.
2. Si todas son «No», la detección termina. Si alguna es «Sí», o la persona se niega a responder, haga la pregunta 5.
3. La hoja no reemplaza la valoración: un positivo pide una evaluación de seguridad antes de que la persona se vaya.

Pregúntele al paciente:

	Sí	No
1. En las últimas semanas, ¿ha deseado estar muerto?	☐	☐
2. En las últimas semanas, ¿ha sentido que usted o su familia estarían mejor si estuviera muerto?	☐	☐
3. En la última semana, ¿ha estado pensando en suicidarse?	☐	☐
4. ¿Alguna vez ha intentado suicidarse?	☐	☐

Si contestó que sí, ¿cómo?

¿Cuándo?

Si el paciente contesta que Sí a alguna de las preguntas anteriores, hágale la siguiente pregunta para evaluar la agudeza:

	Sí	No
5. ¿Está pensando en suicidarse en este momento?	☐	☐

Siguientes pasos

Resultado	Qué hacer
«No» a las preguntas 1 a 4	La prueba de detección está completa; no es necesario hacer la pregunta 5. No hay necesidad de intervención (la opinión clínica siempre puede anteponerse a una prueba de detección negativa).
«Sí» a cualquiera de las preguntas 1 a 4, o se niega a responder	Prueba de detección positiva. Haga la pregunta 5 para evaluar la agudeza.
«Sí» a la pregunta 5	Prueba de detección positiva aguda (riesgo inminente). El paciente necesita una evaluación de salud mental completa o de seguridad URGENTE y no puede irse hasta que se evalúe. Manténgalo a la vista, retire los objetos peligrosos y avise al médico responsable.
«No» a la pregunta 5	Prueba de detección positiva no aguda. El paciente necesita una evaluación de seguridad breve del riesgo de suicidio para determinar si hace falta una evaluación completa, y no puede irse hasta que se evalúe. Avise al médico responsable.

Preguntas de Detección del Riesgo de Suicidio (continuación)

Ofrézcale recursos a toda persona evaluada. La hoja original trae líneas de ayuda de los Estados Unidos; en Colombia, use la ruta de atención en salud mental de su institución y la línea de su territorio.

FUENTE Y PERMISO DE USO

National Institute of Mental Health (2017). Juego de herramientas del NIMH: Herramienta para la Detección del Riesgo de Suicidio (ASQ), versión en español. <https://www.nimh.nih.gov/research/research-conducted-at-nimh/asq-toolkit-materials> · Horowitz, L. M., Bridge, J. A., Teach, S. J. et al. (2012). Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 166(12), 1170–1176. Material del gobierno de los Estados Unidos, de dominio público.