

Test de Identificación de Trastornos debidos al Consumo de Alcohol

AUDIT

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Identificar el consumo de riesgo, el consumo perjudicial y la posible dependencia del alcohol en el último año, y decidir el nivel de intervención. Los ítems 1 a 3 miden el consumo; 4 a 6, síntomas de dependencia; 7 a 10, problemas causados por el alcohol.

CÓMO SE APLICA

1. Antes de empezar, aclare qué es una consumición o bebida estándar: unos 10 a 13 g de alcohol puro, como una botella de cerveza de 330 ml, un vaso de vino de 140 ml o una copa de 40 ml de un destilado como el aguardiente.
2. La persona marca una opción por pregunta. Si en la pregunta 1 marca «Nunca», pasa a las preguntas 9 y 10; si la suma de las preguntas 2 y 3 es 0, también.
3. Se suman los valores de las diez preguntas (0 a 40) y se ubica el total en la tabla de zonas.

Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud e interferir con ciertos medicamentos y tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas sobre su uso del alcohol. Sus respuestas serán confidenciales, así que sea honesto por favor. Marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta a cada pregunta.

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?

- ☐ Nunca (0) ☐ Una o menos veces al mes (1) ☐ De 2 a 4 veces al mes (2) ☐ De 2 a 3 veces a la semana (3)
☐ 4 o más veces a la semana (4)

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo normal?

- ☐ 1 o 2 (0) ☐ 3 o 4 (1) ☐ 5 o 6 (2) ☐ De 7 a 9 (3) ☐ 10 o más (4)

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día?

- ☐ Nunca (0) ☐ Menos de una vez al mes (1) ☐ Mensualmente (2) ☐ Semanalmente (3)
☐ A diario o casi a diario (4)

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez había empezado?

- ☐ Nunca (0) ☐ Menos de una vez al mes (1) ☐ Mensualmente (2) ☐ Semanalmente (3)
☐ A diario o casi a diario (4)

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido?

- ☐ Nunca (0) ☐ Menos de una vez al mes (1) ☐ Mensualmente (2) ☐ Semanalmente (3)
☐ A diario o casi a diario (4)

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior?

- ☐ Nunca (0) ☐ Menos de una vez al mes (1) ☐ Mensualmente (2) ☐ Semanalmente (3)
☐ A diario o casi a diario (4)

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido?

- ☐ Nunca (0) ☐ Menos de una vez al mes (1) ☐ Mensualmente (2) ☐ Semanalmente (3)
☐ A diario o casi a diario (4)

Test de Identificación de Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (continuación)

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?

- ☐ Nunca (0) ☐ Menos de una vez al mes (1) ☐ Mensualmente (2) ☐ Semanalmente (3)
☐ A diario o casi a diario (4)

9. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido?

- ☐ No (0) ☐ Sí, pero no en el curso del último año (2) ☐ Sí, el último año (4)

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han sugerido que deje de beber?

- ☐ No (0) ☐ Sí, pero no en el curso del último año (2) ☐ Sí, el último año (4)

Puntaje total (0 a 40)	Ítems 4 a 6	Ítems 9 y 10	Zona

Calificación e interpretación (Cuadro 6 de la OMS)

Zona	Puntaje	Intervención
Zona I	0 a 7	Educación sobre el alcohol.
Zona II	8 a 15	Consejo simple.
Zona III	16 a 19	Consejo simple más terapia breve y monitorización continuada.
Zona IV	20 a 40	Derivación al especialista para una evaluación diagnóstica y tratamiento.

Según la misma pauta de la OMS, se ofrece el nivel máximo de intervención a quien puntúa 2 o más en las preguntas 4, 5 o 6, o 4 en las preguntas 9 o 10, aunque su total sea bajo. Los puntos de corte pueden variar un poco según los patrones de consumo del país y el contenido de alcohol de las bebidas habituales.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Babor, T. F., Higgins-Biddle, J. C., Saunders, J. B. y Monteiro, M. G. (2001). AUDIT. Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol. Pautas para su utilización en Atención Primaria. Organización Mundial de la Salud (WHO/MSD/MSB/01.6a), Cuadros 4, 6 y 10. El documento de la OMS «puede ser libremente revisado, resumido, reproducido y traducido, en parte o en su totalidad, pero no para la venta o para su utilización con fines comerciales».