

Escala de Activación Conductual para la Depresión, versión breve

BADS-SF

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir cuánto se activó la persona durante la última semana y cuánto evitó: las dos caras que trabaja la activación conductual. Es sensible al cambio y se aplica sesión a sesión.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola, marcando un número por afirmación.
2. Para el puntaje general, los ítems 1, 6, 7 y 8 (Evitación) se invierten (0 = 6, 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1, 6 = 0) y después se suman los nueve.

Lea cuidadosamente cada afirmación y luego encierre en un círculo el número que mejor describa la afirmación que le correspondió DURANTE LA SEMANA PASADA, INCLUIDO HOY.

	No, en absoluto		Un poco		Mucho		Completa- mente
1. Hubo ciertas cosas que tenía que hacer pero que al final no hice.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
2. Estoy contento/a con la cantidad y el tipo de cosas que hice.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
3. Participé en diferentes actividades	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
4. Tomé buenas decisiones sobre el tipo de actividades y situaciones en las que participé.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
5. Fui una persona activa y cumplí los objetivos que me propuse.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
6. La mayor parte de lo que hice fue para escapar o evitar algo desagradable.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
7. Pasé mucho tiempo pensando una y otra vez sobre mis problemas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
8. Hice actividades para distraerme y evitar sentirme mal.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
9. Hice cosas agradables.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6

Activación (2, 3, 4, 5 y 9)

Evitación (1, 6, 7 y 8)

Total, con Evitación invertida (0 a 54)

Modo de corrección e interpretación

Suma de las puntuaciones obtenidas en cada ítem. Está compuesto por dos factores: Evitación (ítems 1, 6, 7 y 8), que corresponde a los ítems negativos o de calificación inversa para la escala general, y Activación (ítems 2, 3, 4, 5 y 9). A mayor puntuación, mayor grado de activación. Las puntuaciones promedio de dos muestras de población general colombiana suelen situarse en torno a los 35 puntos.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Manos, R. C., Kanter, J. W. y Luo, W. (2011). Behavior Therapy, 42(4), 726–739. Validación en Colombia: García, D., Bianchi-Salguero, J. y Montoya, C. (2019), tesis de maestría, Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Versión y formato: KlinikLab, Fundación Universitaria Konrad Lorenz (la.konradlorenz.edu.co/cliniklab-recursos), que autoriza su uso «para fines investigativos, clínicos, educativos, etc., sin que sea necesario solicitar permiso».