

Escala Columbia para Evaluar la Seriedad de la Ideación Suicida

C-SSRS

PARA QUÉ SIRVE

Evaluar el riesgo suicida con preguntas directas y ordenadas: primero la ideación, desde el deseo de estar muerto hasta el plan con intención; después la conducta, incluidos los intentos interrumpidos y los actos preparatorios. Su versión de tamizaje permite decidir en minutos si hace falta una acción inmediata.

ANTES DE USARLO

1. Descárguela del sitio oficial, en la versión y el idioma que necesite: allí están la versión de tamizaje y la versión completa en español.
2. Haga la capacitación gratuita que ofrece la Universidad de Columbia antes de usarla con pacientes.
3. Aplique la versión oficial sin cambiar el orden ni la redacción de las preguntas: su valor está en ser directas.

Qué mide	Gravedad de la ideación suicida en cinco niveles crecientes, su intensidad (frecuencia, duración, control, disuasivos, motivos), la conducta suicida (intentos reales, interrumpidos y abortados, actos preparatorios, autolesión sin intención suicida) y la letalidad de los intentos.
Población	Niños, adolescentes y adultos; hay versiones para cada edad y para distintos escenarios.
Versiones	De tamizaje (unas seis preguntas de sí o no, con ventana del último mes y de los últimos tres meses), completa de línea de base y «desde la última visita» para el seguimiento.
Aplicación	Entrevista, de 2 a 5 minutos la de tamizaje. Tiene versiones autoaplicadas para algunos contextos.
Interpretación	La versión de tamizaje clasifica el riesgo según qué preguntas se responden afirmativamente: la ideación con método, con intención o con plan, y la conducta reciente, señalan riesgo alto y piden acción inmediata el mismo día.
Cómo se consigue	Gratis para uso clínico, académico y de salud pública, en cssrs.columbia.edu . Por eso figura «con registro»: se obtiene del sitio oficial, no se reproduce desde otras fuentes.

ALTERNATIVA DE ACCESO LIBRE

ASQ (Preguntas de Tamizaje de Riesgo Suicida, del Instituto Nacional de Salud Mental de EE. UU.): cuatro preguntas y una de urgencia, en unos 20 segundos, de dominio público y con versión en español. Sirve como primer filtro; un positivo pide la entrevista completa.

Esta ficha no reproduce las preguntas de la C-SSRS. El ítem 9 del PHQ-9 no reemplaza esta evaluación: solo indica cuándo hacerla.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Posner, K., Brown, G. K., Stanley, B., Brent, D. A., Yershova, K. V., Oquendo, M. A. et al. (2011). The Columbia–Suicide Severity Rating Scale. *American Journal of Psychiatry*, 168(12), 1266–1277 · Proyecto C-SSRS, Universidad de Columbia: <https://cssrs.columbia.edu>