

Cuestionario de Preocupación de Pensilvania, versión de 11 ítems

PSWQ-11

Nombre	Fecha	Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir la tendencia a preocuparse: cuánto, con qué frecuencia y con cuánta dificultad para detenerlo. Es el rasgo central del trastorno de ansiedad generalizada. Esta versión breve está validada en Colombia y tiene puntos de corte para TAG moderado y grave.

CÓMO SE APLICA

- La persona lo responde sola, marcando un número por afirmación. Si no puede leer, se le leen las afirmaciones tal como están escritas.
- Se suman los valores marcados. Es una medida de rasgo: sirve más al inicio y al final del tratamiento que semana a semana.

Utilizando la siguiente escala indique hasta qué punto se identifica con cada una de las situaciones que vamos a presentarle a continuación, referidas al modo que tienen las personas de preocuparse.

	Nada	Algo	Regular	Bastante	Mucho
1. Me agobian mis preocupaciones.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
2. Son muchas las circunstancias que hacen que me sienta preocupado/a.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
3. Sé que no debería estar tan preocupado/a por las cosas, pero no puedo hacer nada por evitarlo.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
4. Cuando estoy bajo estados de tensión tiendo a preocuparme muchísimo.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
5. Siempre estoy preocupado/a por algo.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
6. Tan pronto como termino una tarea, enseguida empiezo a preocuparme sobre alguna otra cosa que debo hacer.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
7. Toda mi vida he sido una persona muy preocupada.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
8. Soy consciente de que me he preocupado excesivamente por las cosas.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
9. Una vez que comienzan mis preocupaciones no puedo detenerlas.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
10. Estoy preocupado/a constantemente.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
11. Cuando tengo algún proyecto no dejo de preocuparme hasta haberlo efectuado.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

Puntaje total (11 a 55)

Interpretación

Cuestionario de Preocupación de Pensilvania, versión de 11 ítems (continuación)

Modo de corrección e interpretación

Puntaje	Interpretación
Menos de 33	Por debajo del punto de corte para TAG.
33 a 37	Punto de corte para identificar un trastorno de ansiedad generalizada moderado.
38 o más	Punto de corte para identificar un trastorno de ansiedad generalizada severo.

Suma de las puntuaciones obtenidas en cada ítem. A mayor puntuación, mayor grado de preocupación. Un puntaje sobre el corte orienta la entrevista; el diagnóstico de TAG exige los demás criterios.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L. y Borkovec, T. D. (1990). Behaviour Research and Therapy, 28, 487–495. Validación en Colombia: Ruiz, F. J., Monroy-Cifuentes, A. y Suárez-Falcón, J. C. (2018). Anales de Psicología, 34, 451–457. Versión y formato: KlinikLab, Fundación Universitaria Konrad Lorenz (la.konradlorenz.edu.co/cliniklab-recursos), que autoriza su uso «para fines investigativos, clínicos, educativos, etc., sin que sea necesario solicitar permiso».