

Escala de Acomodación Familiar a los síntomas del TOC

FAS

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir cuánto participa la familia en los síntomas obsesivo-compulsivos del niño o adolescente: dar seguridad, esperar, facilitar rituales y evitaciones, cambiar rutinas o asumir responsabilidades del paciente. La acomodación mantiene el TOC, así que es un blanco directo del tratamiento.

CÓMO SE APLICA

1. Es una entrevista: el clínico pregunta a la familia por cada área y puntúa de 0 (nada o no aplicable) a 4 (grave).
2. Se suman las 12 áreas: el total va de 0 a 48.

Con la información que aporta la familia en la entrevista, puntúe cuánto se da cada tipo de acomodación a los síntomas del TOC.

	Nada o no aplicable	Leve	Moderado	Severo	Grave
1. Proporcionar seguridad al paciente	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
2. Observar (vigilar) al paciente deliberadamente completando sus rituales	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
3. Esperar por el paciente	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
4. Abstenerse de decir o hacer cosas	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
5. Facilitar la evitación	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
6. Facilitar las compulsiones	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
7. Participar en las compulsiones	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
8. Ayudar en tareas simples	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
9. Tolerar conductas extrañas o perturbación del hogar	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
10. Modificar la rutina personal	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
11. Modificar la rutina familiar	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
12. Asumir responsabilidades del paciente	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Total (0 a 48)

Áreas más altas

No tiene puntos de corte. En la validación española, con adolescentes al inicio del tratamiento, la media fue de 16,2 (DE 12,8) y bajó a 3,9 a los 12 meses, en paralelo con la mejoría del TOC. Las áreas más altas indican qué acomodaciones trabajar primero con la familia.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Calvocoressi, L., Mazure, C. M., Kasl, S. V., Skolnick, J., Fisk, D., Vegso, S. J., Van Noppen, B. L. y Price, L. H. (1999). Family accommodation of obsessive-compulsive symptoms: Instrument development and assessment of family behavior. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 187, 636–642 .
 Versión española para adolescentes: Otero, S. y Rivas, A. (2007). Adaptación y validación de la escala de acomodación familiar a los síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo en una muestra de adolescentes españoles. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 35(2), 99–104, tabla 1. Las áreas y la escala se toman de la tabla 1 de la versión española, de acceso abierto; la consigna es de esta guía. El permiso de reproducción del original está por confirmar.