

Escala de Gravedad del Trastorno de Pánico

PDSS

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir la gravedad del trastorno de pánico en la última semana: frecuencia y malestar de las crisis, ansiedad anticipatoria, evitación de situaciones y de sensaciones, e interferencia en el trabajo y en la vida social. Sirve para seguir el tratamiento sesión a sesión.

CÓMO SE APLICA

1. La persona la responde sola, pensando en la última semana. Cada pregunta vale de 0 a 4; el total va de 0 a 28.
2. La pregunta final la responde el clínico: si hay agorafobia, los cortes de gravedad son otros.

A continuación, le presentamos una serie de preguntas relacionadas con sus ataques de pánico. Marque con una cruz la respuesta que mejor explique cómo interfieren estos ataques en su vida.

1. ¿Cuántos ataques de pánico y crisis de síntomas limitados ha tenido durante la semana?

- ☐ Ni ataques de pánico ni crisis de síntomas limitados. (0)
- ☐ Ligero: Ningún ataque de pánico y no más de una crisis de síntomas limitada al día. (1)
- ☐ Moderado: Uno o dos ataques de pánico y/o múltiples crisis de síntomas limitados al día. (2)
- ☐ Severo: Más de dos ataques de pánico, pero no más de uno al día en promedio (3)
- ☐ Extremo: Los ataques de pánico ocurrieron más de una vez al día la mayoría de días. (4)

2. Si ha tenido algún ataque de pánico durante la semana pasada, ¿cuán desagradables (molestos, espantosos) fueron mientras estaban sucediendo? (si ha tenido más de uno saque un promedio entre ellos; si no ha tenido ningún ataque de pánico pero sí crisis de síntomas limitados, responda teniendo en cuenta estas crisis).

- ☐ En absoluto desagradables, o sin ataques de pánico ni crisis de síntomas limitados durante la semana pasada. (0)
- ☐ Ligeramente desagradable (no demasiado intenso). (1) ☐ Moderadamente desagradable (intenso, pero manejable). (2)
- ☐ Severamente desagradable (muy intenso). (3)
- ☐ Extremadamente desagradable (extremo malestar durante todos los ataques). (4)

3. Durante la semana pasada, ¿cuánto le ha preocupado o sentido ansiedad acerca de cuándo sería el próximo ataque de pánico o acerca de miedos relacionados con los ataques? (por ejemplo, que signifiquen que tiene problemas físicos o mentales, o que puedan avergonzarle en público).

- ☐ No, en absoluto. (0) ☐ Ocasional o tan solo ligeramente. (1) ☐ Frecuentemente o de manera moderada. (2)
- ☐ Muy a menudo o de una manera muy molesta. (3) ☐ Prácticamente siempre y de manera muy molesta. (4)

4. Durante la semana pasada, ¿hubo algún lugar o situación (por ejemplo, transportes públicos, cines, multitudes, puentes, túneles, centros comerciales o estar solo) que evitara o que temiera (que se sintiera incómodo, quisiera evitar o irse) por temor a tener un ataque de pánico? ¿Hay otras situaciones que haya evitado o que haya temido durante la semana por el mismo motivo? Si ha sido así, por favor, valore su nivel de miedo y evitación durante la semana pasada.

- ☐ Ninguno. Ni miedo ni evitación. (0)
- ☐ Ligero. Miedo y/o evitación ocasional, aunque normalmente pude controlar o aguantar la situación. Mi día a día apenas cambió debido a esto. (1)
- ☐ Moderado. Miedo y/o evitación evidente, pero aún manejable. Evité algunas situaciones, pero pude afrontarlas en compañía. Mi día a día se vio ligeramente afectado, pero mi funcionamiento general no se resintió. (2)
- ☐ Severo. Evitación considerable. Mi día a día se modificó notablemente a causa de la evitación, lo que me dificultó realizar actividades cotidianas. (3)
- ☐ Extremo. Temor y/o evitación extremadamente incapacitante. Mi día a día se vio tan afectado que no realicé incluso tareas importantes. (4)

Escala de Gravedad del Trastorno de Pánico (continuación)

5. Durante la semana pasada, ¿hubo alguna actividad (por ejemplo, ejercicio físico, relaciones sexuales, tomar un baño o una ducha calientes, beber café, mirar una película de acción o de miedo) que evitara o le diera miedo (que le resultara molesta, quisiera evitarla o detenerla) porque le generase sensaciones físicas similares a aquellas que siente durante los ataques de pánico o porque temiera que le provocara un ataque de pánico? ¿Hay otras actividades que, por ese mismo motivo, hubiera evitado, o le hubieran asustado si se hubieran presentado durante la semana? Si la respuesta es sí a cualquiera de las dos preguntas, por favor, valore el nivel de miedo y evitación hacia esas actividades durante la pasada semana.

- ☐ Ni miedo ni evitación hacia actividades o situaciones debido a sensaciones físicas molestas. (0)
- ☐ Ligero. Miedo y/o evitaciones ocasionales que normalmente pude controlar o aguantar, aunque con ligero malestar. Son actividades que me generan sensaciones físicas. Mi día a día no se vio afectado debido a esto. (1)
- ☐ Moderado. La evitación era evidente pero manejable. Mi día a día se modificó, pero mi funcionamiento general no se vio afectado. (2)
- ☐ Severo. Evitación importante. Mi día a día se modificó de manera importante y afectó a mi funcionamiento. (3)
- ☐ Extremo. Evitación extremadamente incapacitante, mi día a día se vio tan afectado que no realicé ni las tareas importantes. (4)

6. Durante la semana pasada, ¿en qué medida los síntomas que ha visto, en su conjunto (ataques de pánico, crisis de síntomas limitados y la preocupación por los ataques), han interferido con su habilidad para trabajar o llevar a cabo sus responsabilidades en el hogar? (si su trabajo o responsabilidades del hogar han sido inferiores a lo habitual durante la semana pasada, conteste en relación con lo que hubieran interferido en una semana normal).

- ☐ Sin interferencia en el trabajo ni en las responsabilidades del hogar. (0)
- ☐ Ligera interferencia en trabajo o en las responsabilidades del hogar. Aun así pude hacer las cosas como las hubiera hecho sin tener esos problemas. (1)
- ☐ Interferencia significativa con el trabajo o las tareas del hogar. A pesar de eso pude hacer las cosas que tenía que hacer. (2)
- ☐ Interferencia importante en el trabajo o en las responsabilidades del hogar. Hubo varias cosas importantes que no pude hacer debido a estos problemas. (3)
- ☐ Interferencia extremadamente incapacitante. En esencia fui incapaz de ocuparme del trabajo o de las responsabilidades del hogar. (4)

7. Durante la semana pasada, ¿cuánto interfirieron en su vida social los ataques de pánico o las crisis de síntomas limitados, la preocupación por dichos ataques o el temor ante ciertas situaciones y actividades? (si durante la semana pasada no tuvo muchas oportunidades para socializar, responda cuánto cree que habría interferido de haberlas tenido).

- ☐ Sin interferencia. (0)
- ☐ Ligera interferencia con actividades sociales, pero pude hacer casi todo lo que haría sin haber tenido estos problemas. (1)
- ☐ Interferencia significativa con actividades sociales, pero pude ser capaz de hacer la mayoría de cosas haciendo un esfuerzo. (2)
- ☐ Interferencia importante en las actividades sociales. Hubo algunas actividades sociales que no pude hacer debido a estos problemas. (3)
- ☐ Interferencia extremadamente incapacitante, tanto que prácticamente no hubo ninguna actividad social que pudiera hacer. (4)

Para el clínico: ¿la persona tiene agorafobia?

- ☐ Sí
- ☐ No

Total (0 a 28)

Gravedad

Escala de Gravedad del Trastorno de Pánico (continuación)

Interpretación del total (Furukawa et al., 2009)

Gravedad	Sin agorafobia	Con agorafobia
Normal	0 a 1	0 a 2
Límite	2 a 5	3 a 7
Levemente enfermo	6 a 9	8 a 10
Moderadamente enfermo	10 a 13	11 a 15
Marcadamente enfermo	14 o más	16 o más

Los cortes se obtuvieron con la versión que puntúa el clínico; en el autoinforme tómelos como orientación. Furukawa et al. proponen hablar de remisión con 5 o menos y de respuesta al tratamiento con una baja del 40 % o más.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Shear, M. K., Brown, T. A., Barlow, D. H., Money, R., Sholomskas, D. E., Woods, S. W., Gorman, J. M. y Papp, L. A. (1997). Multicenter collaborative Panic Disorder Severity Scale. *American Journal of Psychiatry*, 154, 1571–1575 · Traducción: Labpsitec (2003) · Interpretación: Furukawa, T. A. et al. (2009). Evidence-based guidelines for interpretation of the Panic Disorder Severity Scale. *Depression and Anxiety*, 26, 922–929. El permiso de reproducción está por confirmar. Se reproduce con la copia del docente; la pregunta para el clínico es de esta guía.