

Escala Global de Gravedad e Interferencia de la Ansiedad

OASIS

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir en cinco preguntas la frecuencia y la intensidad de la ansiedad, la evitación y cuánto interfiere en el trabajo, el estudio, el hogar y la vida social durante la última semana. No es específica de un trastorno: sirve para cualquier problema de ansiedad, también por debajo del umbral diagnóstico, y está pensada para aplicarse en cada sesión.

CÓMO SE APLICA

1. La persona la responde sola, pensando en la última semana. Si no puede leer, se le leen las preguntas y las opciones tal como están escritas.
2. Cada pregunta vale de 0 a 4 según la opción marcada; el total va de 0 a 20.
3. Apúntelo en cada sesión: lo que informa es la tendencia a lo largo del tratamiento, más que un puntaje aislado.

Los siguientes ítems preguntan sobre ansiedad. Para cada ítem, rodee el número que mejor describa su experiencia durante la última semana.

1. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia te has sentido ansioso?

- ☐ No me sentí ansioso durante la última semana. (0) ☐ Ansiedad infrecuente. Me sentí ansioso en algunos momentos. (1)
- ☐ Ansiedad ocasional. La mitad del tiempo me sentí ansioso y la otra mitad no. Me costó relajarme. (2)
- ☐ Ansiedad frecuente. Me sentí ansioso la mayor parte del tiempo. Me resultó muy difícil relajarme. (3)
- ☐ Ansiedad constante. Me sentí ansioso todo el tiempo y nunca llegué a relajarme. (4)

2. Durante la última semana, cuando te sentiste ansioso, ¿cómo de intensa o grave fue tu ansiedad?

- ☐ Poco o nada. La ansiedad estuvo ausente o casi no la noté. (0)
- ☐ Leve. La ansiedad fue de baja intensidad. Pude relajarme cuando lo intenté. Los síntomas físicos fueron solo un poco molestos. (1)
- ☐ Moderada. La ansiedad me generó malestar en algunos momentos. Me resultó difícil relajarme o concentrarme, pero pude hacerlo cuando lo intenté. Los síntomas físicos fueron molestos. (2)
- ☐ Severa. La ansiedad fue intensa la mayor parte del tiempo. Me resultó muy difícil relajarme o concentrarme en cualquier otra cosa. Los síntomas físicos fueron enormemente molestos. (3)
- ☐ Extrema. La ansiedad me sobrepasó. Me fue totalmente imposible relajarme. Los síntomas físicos fueron insoportables. (4)

3. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia evitaste situaciones, lugares, objetos o actividades debido a tu ansiedad o miedo?

- ☐ Ninguna. No evité lugares, situaciones, actividades o cosas por miedo. (0)
- ☐ Infrecuente. Evité algunas cosas de vez en cuando, pero por lo general me enfrenté a las situaciones u objetos. Mi estilo de vida no se vio afectado. (1)
- ☐ Ocasional. Tuve algo de miedo a ciertas situaciones, lugares u objetos, pero todavía pude manejarlos. Mi estilo de vida sufrió pocos cambios. Siempre o casi siempre evité las cosas que me dan miedo si estaba solo, pero las pude manejar si alguien venía conmigo. (2)
- ☐ Frecuente. Tuve bastante miedo y realmente intenté evitar las cosas que me asustan. He hecho cambios significativos en mi estilo de vida para evitar objetos, situaciones, actividades o lugares. (3)
- ☐ Todo el tiempo. Evitar objetos, situaciones, actividades o lugares ha ocupado gran parte de mi vida. Mi estilo de vida se ha visto enormemente afectado y ya no hago cosas con las que solía disfrutar. (4)

Escala Global de Gravedad e Interferencia de la Ansiedad (continuación)

4. Durante la última semana, ¿en qué medida ha interferido la ansiedad en tu capacidad para hacer las cosas que necesitabas hacer en el trabajo, el colegio o en tu hogar?

- ☐ Nada. La ansiedad no interfirió en mi trabajo/hogar/colegio. (0)
- ☐ Leve. La ansiedad me causó algo de interferencia en mi trabajo/hogar/colegio. Las cosas eran más difíciles, pero pude realizar todo lo que necesitaba hacer. (1)
- ☐ Moderada. La ansiedad definitivamente interfirió en mis tareas. He podido realizar la mayoría de las cosas, pero solo algunas las he hecho tan bien como en el pasado. (2)
- ☐ Severa. La ansiedad verdaderamente ha cambiado mi capacidad para hacer las cosas. Algunas cosas las he podido realizar, pero otras no. Mi rendimiento se ha visto definitivamente afectado. (3)
- ☐ Extrema. La ansiedad ha llegado a ser incapacitante. He sido incapaz de completar mis tareas y he tenido que irme del colegio, he dejado o me han despedido de mi trabajo o he sido incapaz de completar las tareas del hogar y he sufrido consecuencias como desalojos, cobradores de facturas, etc. (4)

5. Durante la última semana, ¿en qué medida ha interferido la ansiedad en tu vida social y en tus relaciones?

- ☐ Nada. La ansiedad no interfirió en mis relaciones. (0)
- ☐ Leve. La ansiedad apenas interfirió en mis relaciones. Algunas de mis amistades y otras relaciones se han visto afectadas, pero en conjunto mi vida social sigue siendo satisfactoria. (1)
- ☐ Moderada. La ansiedad interfirió algo en mi vida social, pero sigo teniendo algunas relaciones cercanas. No paso tanto tiempo con otros como en el pasado, pero sigo teniendo relaciones sociales algunas veces. (2)
- ☐ Severa. Mis amistades y otras relaciones se han visto muy afectadas a causa de mi ansiedad. No disfruto de las actividades sociales. Tengo muy pocas relaciones sociales. (3)
- ☐ Extrema. La ansiedad ha alterado completamente mis actividades sociales. Todas mis relaciones se han visto afectadas o han finalizado. Mi vida familiar es extremadamente tensa. (4)

Puntaje total (0 a 20)

Interpretación

Modo de corrección e interpretación	
Puntaje	Interpretación
0 a 9	Por debajo del punto de corte.
10 a 20	Sobre el punto de corte de la validación española (Osma et al., 2019, muestra clínica ambulatoria): ansiedad clínicamente relevante probable.

Suma de las cinco preguntas. En la validación colombiana (García-Mejía et al., 2026), hecha con personas afectadas por el conflicto armado, el mejor corte fue 11. El puntaje no diagnostica: un valor sobre el corte orienta la entrevista, y su utilidad mayor es seguir el cambio sesión a sesión.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Norman, S. B., Cissell, S. H., Means-Christensen, A. J. y Stein, M. B. (2006). Development and validation of an Overall Anxiety Severity and Impairment Scale (OASIS). *Depression and Anxiety*, 23, 245–249 · Versión en castellano: Osma, J., Quilez-Orden, A., Suso-Ribera, C., Peris-Baquero, O., Norman, S. B., Bentley, K. H. y Sauer-Zavala, S. (2019). *Journal of Affective Disorders*, 252, 9–18; texto de Barlow, D. H. et al. (2019). *Protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales: manual del paciente* (2.ª ed.; J. Osma y E. Crespo, trads.). Alianza · Validación colombiana: García-Mejía, N., Moreno-Villamizar, J. D., Ángel, J. D., Parada, C. y Castro-Camacho, L. (2026). *International Journal of Cognitive Behavioral Therapy*, 19, 479–498. La escala original es de uso libre. La traducción al castellano forma parte del manual del paciente del Protocolo unificado (Alianza Editorial).