

Escala Global de Gravedad e Interferencia de la Depresión

ODSIS

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir en cinco preguntas la frecuencia y la intensidad de la depresión, la pérdida de interés en lo que se disfrutaba y cuánto interfiere en el trabajo, el estudio, el hogar y la vida social durante la última semana. Es la hermana de la OASIS: no es específica de un trastorno y está pensada para aplicarse en cada sesión.

CÓMO SE APLICA

1. La persona la responde sola, pensando en la última semana. Si no puede leer, se le leen las preguntas y las opciones tal como están escritas.
2. Cada pregunta vale de 0 a 4 según la opción marcada; el total va de 0 a 20.
3. Apúntelo en cada sesión: lo que informa es la tendencia a lo largo del tratamiento, más que un puntaje aislado.

Los siguientes ítems preguntan sobre depresión. Para cada ítem, rodee el número que mejor describa su experiencia durante la última semana.

1. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia te has sentido deprimido?

- ☐ No me sentí deprimido durante la última semana. (0)
- ☐ Depresión infrecuente. Me sentí deprimido en algunos momentos. (1)
- ☐ Depresión ocasional. La mitad del tiempo me sentí deprimido y la otra mitad no. (2)
- ☐ Depresión frecuente. Me sentí deprimido la mayor parte del tiempo. (3)
- ☐ Depresión constante. Me sentí deprimido todo el tiempo. (4)

2. Durante la última semana, cuando te sentiste deprimido, ¿cómo de intensa o grave fue tu depresión?

- ☐ Poco o nada. La depresión estuvo ausente o casi no la noté. (0) ☐ Leve. La depresión fue de baja intensidad. (1)
- ☐ Moderada. La depresión me generó malestar en algunos momentos. (2)
- ☐ Severa. La depresión fue intensa la mayor parte del tiempo. (3) ☐ Extrema. La depresión me sobrepasó. (4)

3. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia tuviste dificultad para realizar o interesarte en actividades que normalmente disfrutas debido a tu depresión?

- ☐ Ninguna. No tuve dificultades para realizar o interesarme en actividades que normalmente disfruto debido a la depresión. (0)
- ☐ Infrecuente. Algunas veces tuve dificultades para realizar actividades o interesarme en actividades que normalmente disfruto, debido a la depresión. Mi estilo de vida no se vio afectado. (1)
- ☐ Ocasional. Tuve algunas dificultades para realizar actividades o interesarme en actividades que normalmente disfruto, debido a la depresión. Mi estilo de vida sufrió pocos cambios. (2)
- ☐ Frecuente. Tuve bastantes dificultades para realizar actividades o interesarme en actividades que normalmente disfruto, debido a la depresión. He realizado cambios significativos en mi estilo de vida por no poder interesarme en actividades que solía disfrutar. (3)
- ☐ Todo el tiempo. No he podido participar o interesarme en actividades que normalmente disfruto, debido a la depresión. Mi estilo de vida se ha visto enormemente afectado y ya no hago cosas que solía disfrutar. (4)

Escala Global de Gravedad e Interferencia de la Depresión (continuación)

4. Durante la última semana, ¿en qué medida ha interferido la depresión en tu capacidad para hacer las cosas que necesitabas hacer en el trabajo, el colegio o en tu hogar?

- ☐
Nada. La depresión no interfirió en mi trabajo/hogar/colegio. (0)
- ☐
Leve. La depresión me causó algo de interferencia en mi trabajo/hogar/colegio. Las cosas fueron más difíciles, pero pude realizar todo lo que necesitaba hacer. (1)
- ☐
Moderada. La depresión definitivamente interfirió en mis tareas. He podido realizar la mayoría de las cosas, pero solo algunas las he hecho tan bien como en el pasado. (2)
- ☐
Severa. La depresión verdaderamente ha interferido en mis tareas. Algunas tareas las he podido realizar, pero muchas otras no. Mi rendimiento se ha visto definitivamente afectado. (3)
- ☐
Extrema. La depresión ha llegado a ser incapacitante. He sido incapaz de completar mis tareas y he tenido que irme del colegio, he dejado o me han despedido de mi trabajo o he sido incapaz de completar las tareas del hogar y he sufrido consecuencias como desalojos, cobradores de facturas, etc. (4)

5. Durante la última semana, ¿en qué medida ha interferido la depresión en tu vida social y en tus relaciones?

- ☐
Nada. La depresión no interfirió en mis relaciones. (0)
- ☐
Leve. La depresión apenas interfirió en mis relaciones. Algunas de mis amistades y otras relaciones se han visto afectadas, pero en conjunto mi vida social sigue siendo satisfactoria. (1)
- ☐
Moderada. La depresión ha interferido algo en mi vida social, pero sigo teniendo algunas relaciones cercanas. No paso tanto tiempo con otros como en el pasado, pero sigo manteniendo relaciones sociales algunas veces. (2)
- ☐
Severa. Mis amistades y otras relaciones se han visto muy afectadas a causa de mi depresión. No disfruto de las actividades sociales. Tengo muy pocas relaciones sociales. (3)
- ☐
Extrema. La depresión ha alterado completamente mis actividades sociales. Todas mis relaciones se han visto afectadas o han finalizado. Mi vida familiar es extremadamente tensa. (4)

Puntaje total (0 a 20)

Interpretación

Modo de corrección e interpretación	
Puntaje	Interpretación
0 a 9	Por debajo del punto de corte.
10 a 20	Sobre el punto de corte de la validación española (Osma et al., 2019, muestra clínica ambulatoria): depresión clínicamente relevante probable.

Suma de las cinco preguntas. En la validación colombiana (García-Mejía et al., 2026), hecha con personas afectadas por el conflicto armado, el mejor corte fue 12. El puntaje no diagnostica: un valor sobre el corte orienta la entrevista, y su utilidad mayor es seguir el cambio sesión a sesión.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Bentley, K. H., Gallagher, M. W., Carl, J. R. y Barlow, D. H. (2014). Development and validation of the Overall Depression Severity and Impairment Scale. Psychological Assessment, 26, 815–830 · Versión en castellano: Osma, J., Quilez-Orden, A., Suso-Ribera, C., Peris-Baquero, O., Norman, S. B., Bentley, K. H. y Sauer-Zavala, S. (2019). Journal of Affective Disorders, 252, 9–18; texto de Barlow, D. H. et al. (2019). Protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales: manual del paciente (2.ª ed.; J. Osma y E. Crespo, trads.). Alianza · Validación colombiana: García-Mejía, N., Moreno-Villamizar, J. D., Ángel, J. D., Parada, C. y Castro-Camacho, L. (2026). International Journal of Cognitive Behavioral Therapy, 19, 479–498. La escala original es de uso libre. La traducción al castellano forma parte del manual del paciente del Protocolo unificado (Alianza Editorial).