

Herramienta de Tamizaje de Maltrato a la Mujer, versión corta

WAST

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Abrir el tema de la violencia de pareja con dos preguntas que no la nombran de entrada: cuánta tensión hay en la relación y con cuánta dificultad se resuelven las discusiones. Son las dos preguntas del WAST con las que las mujeres dijeron sentirse más cómodas.

CÓMO SE APLICA

1. Se aplica a solas con la mujer, sin la pareja presente, en entrevista o autoaplicada.
2. Con el primer criterio, que es el recomendado para la versión en español, «alguna» y «muchacha» valen 1 y «sin» vale 0: el tamizaje es positivo con 2 puntos.
3. Un positivo no confirma el maltrato: pide seguir preguntando, valorar la seguridad y activar la ruta de atención.

1. En general, ¿cómo describiría usted su relación con su pareja?

- ☐ Mucha tensión (1)
 ☐ Alguna tensión (1)
 ☐ Sin tensión (0)

2. Usted y su pareja resuelven sus discusiones con:

- ☐ Mucha dificultad (1)
 ☐ Alguna dificultad (1)
 ☐ Sin dificultad (0)

Puntaje (0 a 2)

Resultado

Dos formas de puntuar

Criterio	Cómo se puntúa y qué indica
Primero (el de la ficha)	«Alguna» o «muchacha» valen 1. Total de 0 a 2; positivo con 2. En atención primaria en España tuvo una sensibilidad de 91,4 % y una especificidad de 76,2 %.
Segundo	Solo «muchacha» y «muchacha» valen 1. Total de 0 a 2; positivo con 1 o 2. Los autores del original lo prefirieron en inglés; para la versión en español se recomienda el primero.

Su especificidad es baja: de cada 10 positivos, unos 6 no se confirmaron con la medida de referencia (valor predictivo positivo de 40,2 %), así que se usa con cautela y nunca como única prueba. Un negativo fue muy confiable (valor predictivo negativo de 98,1 %).

FUENTE Y PERMISO DE USO

Brown, J. B., Lent, B., Brett, P. J., Sas, G. y Pederson, L. L. (1996). Development of the Woman Abuse Screening Tool for use in family practice. *Family Medicine*, 28, 422–428 · Versión en español: Fogarty, C. T. y Brown, J. B. (2002). Screening for abuse in Spanish-speaking women. *Journal of the American Board of Family Medicine*, 15, 101–111 · Texto tomado de Plazaola-Castaño, J., Ruiz-Pérez, I. y Hernández-Torres, E. (2008). Validación de la versión corta del Woman Abuse Screening Tool para su uso en atención primaria en España. *Gaceta Sanitaria*, 22(5), 415–420, tabla 1. Las dos preguntas se toman de un artículo de acceso abierto de Gaceta Sanitaria, con licencia Creative Commons de uso no comercial. La ficha trae solo la versión corta, no el WAST completo.