INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CON LICENCIA

Cuestionario de Calidad de Vida de Minnesota en Insuficiencia Cardíaca

MLHFQ

Nombre | Fecha | Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir cuánto la insuficiencia cardíaca le ha impedido a la persona vivir como desea en el último mes: síntomas y limitación física, efecto emocional y consecuencias sociales y económicas. Sirve para describir la calidad de vida relacionada con la salud y seguir el cambio en rehabilitación cardíaca o en el acompañamiento psicológico.

CÓMO SE APLICA

1. La responde la persona (o se le lee si tiene dificultad para leer), marcando de 0 (no) a 5 (muchísimo) cuánto la afectó cada aspecto en las últimas 4 semanas. Si una pregunta no aplica, se marca 0.
2. Total: suma de las 21 respuestas (0 a 105). Dimensión física: preguntas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 y 13 (0 a 40). Dimensión emocional: preguntas 17 a 21 (0 a 25). Las demás solo suman al total. A más puntaje, peor calidad de vida.

Las siguientes preguntas son acerca de cuánto su falla cardíaca (enfermedad del corazón) ha afectado su vida durante el último mes (últimas 4 semanas). Después de cada pregunta, encierre en un círculo el 0, 1, 2, 3, 4 o 5 para indicar cuánto se ha visto afectada su vida. Si alguna pregunta no aplica para usted, encierre en un círculo el 0. ¿Su falla cardiaca no le ha permitido vivir como usted desea durante el último mes (últimas 4 semanas) porque…

	No	Muy poco	Poco	Algo	Mucho	Muchísimo
1. ¿Se le han hinchado sus tobillos o piernas?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
2. ¿Se ha tenido que sentar o acostar a descansar durante el día?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
3. ¿Se le ha dificultado salir a caminar o subir escaleras?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
4. ¿Se le ha dificultado hacer labores domésticas livianas?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
5. ¿Se le ha dificultado ir a sitios lejanos de su casa?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
6. ¿Se le ha dificultado dormir bien en las noches?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
7. ¿Se le ha dificultado relacionarse o realizar actividades con sus amigos o familiares?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
8. ¿Se le ha dificultado trabajar para su sostenimiento económico?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
9. ¿Se le ha dificultado realizar sus actividades de recreación, deporte y pasatiempos?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
10. ¿Se le ha dificultado tener relaciones sexuales?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
11. ¿Ha comido menos los alimentos que le gustan?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
12. ¿Ha sentido que le falta el aire?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
13. ¿Se ha cansado, fatigado o sentido sin energías?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
14. ¿Ha tenido que estar hospitalizado?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
15. ¿Ha tenido que gastar dinero en su cuidado médico?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
16. ¿Ha tenido efectos secundarios por causa de los tratamientos?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
17. ¿Se ha sentido una carga para su familia o amigos?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

Fuente: Rector, Kubo y Cohn (1987) · versión colombiana de Lugo-Agudelo et al. (2020) · derechos de la Universidad de Minnesota.

Cuestionario de Calidad de Vida de Minnesota en Insuficiencia Cardíaca (continuación)

	No	Muy poco	Poco	Algo	Mucho	Muchísimo
18. ¿Ha sentido que pierde el control de su vida?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
19. ¿Se ha sentido preocupado?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
20. ¿Le ha sido difícil concentrarse o recordar cosas?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
21. ¿Se ha sentido deprimido?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

Dimensión física (0 a 40)

Dimensión emocional (0 a 25)

Puntaje total (0 a 105)

Referencia colombiana (Lugo-Agudelo et al., 2020, tabla 1; 134 pacientes de Medellín)

Puntaje	Media (DE)	Cambio mínimo detectable
Física	9,7 (7,9)	6,0
Emocional	4,8 (4,7)	4,8
Total	25,3 (16,7)	12,6

No hay puntos de corte publicados: compare con la media de referencia y, en el seguimiento, considere que hubo cambio real cuando la diferencia supera el cambio mínimo detectable. En otra muestra colombiana (Rojas et al., 2019; 200 pacientes de Floridablanca) las medianas fueron 40 (total), 11 (física) y 7 (emocional), con alfa de 0,91. Una dimensión emocional alta pide explorar depresión y ansiedad (por ejemplo, con la HADS).

FUENTE Y PERMISO DE USO

Rector, T. S., Kubo, S. H. y Cohn, J. N. (1987). Patients' self-assessment of their congestive heart failure. Heart Failure, 3, 198–209 · Versión colombiana: Lugo-Agudelo, L. H., Ortiz-Rangel, S. D., Rodríguez-Guevara, C., Vargas-Montoya, D. M., Aguirre-Acevedo, D. C., Vera-Giraldo, C. Y. y Navas-Ríos, C. M. (2020). Validación del Minnesota Living with Heart Failure questionnaire (MLFHQ) en pacientes con falla cardíaca. Revista Colombiana de Cardiología, 27(6), 564–572. https://doi.org/10.1016/j.rccar.2019.04.003 · Ver también Rojas, L. Z. et al. (2019). Salud UIS, 51(1), 11–22, y Garin, O. et al. (2008). Rev Esp Cardiol, 61(3), 251–259. Los derechos son de la Universidad de Minnesota (Thomas S. Rector), que concede licencias de uso. Se reproduce la versión colombiana publicada como material suplementario del artículo, por decisión del docente.