

Inventario de Depresión de Beck, segunda edición

BDI-II

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir la gravedad de los síntomas depresivos de las dos últimas semanas en adolescentes desde los 13 años y adultos: tristeza, pérdida de placer, culpa, pesimismo, ideación suicida, cambios del sueño y del apetito, fatiga, entre otros. Sirve para tamizar y para seguir el tratamiento.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola, pensando en las dos últimas semanas, incluido el día de hoy. En cada grupo marca la afirmación que mejor la describe.
2. Cada grupo vale de 0 a 3 (en sueño y apetito, 1a y 1b valen 1, y así sucesivamente). Se suman los 21: el total va de 0 a 63.

Hoja de respuestas: aplique la prueba con su protocolo original y anote aquí la respuesta de cada ítem. Esta hoja no reproduce los ítems, cuyos derechos son del editor.

Ítem 1

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 2

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 3

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 4

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 5

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 6

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 7

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 8

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 9

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 10

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 11

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 12

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 13

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Inventario de Depresión de Beck, segunda edición (continuación)

Ítem 14

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 15

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 16

☐ 0 (0) ☐ 1a (1) ☐ 1b (1) ☐ 2a (2) ☐ 2b (2) ☐ 3a (3) ☐ 3b (3)

Ítem 17

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 18

☐ 0 (0) ☐ 1a (1) ☐ 1b (1) ☐ 2a (2) ☐ 2b (2) ☐ 3a (3) ☐ 3b (3)

Ítem 19

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 20

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Ítem 21

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2) ☐ 3 (3)

Total (0 a 63)

Gravedad

----------------------	----------------------

Gravedad de la depresión (manual, tabla 2.1)

Puntaje	Gravedad
0 a 13	Mínima
14 a 19	Leve
20 a 28	Moderada
29 a 63	Grave

Si la persona marca dos afirmaciones de un grupo, cuenta la de mayor valor. En sueño (16) y apetito (18) las opciones «a» y «b» valen lo mismo; anote cuál eligió, porque distingue aumento de disminución. Revise siempre el grupo 9 (pensamientos de suicidio): cualquier respuesta distinta de 0 pide valorar el riesgo suicida en la misma sesión, sea cual sea el total; el manual pide examinarlo a fondo cuando el 9 o el 2 (pesimismo) llegan a 2 o 3. El BDI-II estima la gravedad, no hace el diagnóstico.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Beck, A. T., Steer, R. A. y Brown, G. K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory-II. Psychological Corporation · Adaptación española: Sanz, J. y Vázquez, C. BDI-II. Inventario de Depresión de Beck-II. Pearson Educación. © 1996 Aaron T. Beck; edición española © 2003 Aaron T. Beck, Pearson Educación. Prueba comercial: se usa con el protocolo comprado. Esta es la hoja de respuestas publicada; la versión con los ítems es solo de uso personal del docente.