

Escala Revisada de Ansiedad y Depresión Infantil, versión de 30 ítems

RCADS-30

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir síntomas de depresión y de cinco tipos de ansiedad en niños y adolescentes: pánico, fobia social, ansiedad de separación, ansiedad generalizada y síntomas obsesivo-compulsivos. Es breve y sirve para seguir el cambio en ansiedad y depresión a la vez.

CÓMO SE APLICA

- El niño la responde solo, marcando con qué frecuencia le pasa cada cosa. A los más pequeños se les pueden leer las frases tal como están escritas.
- Nunca vale 0, A veces 1, A menudo 2 y Siempre 3. Cada subescala suma sus cinco ítems (de 0 a 15) y el total suma los 30 (de 0 a 90).
- Repítala a lo largo del tratamiento: lo que más informa es el cambio de cada subescala.

Por favor rodea con un círculo la palabra que mejor refleje la frecuencia con que te ocurre cada una de las siguientes cosas. No hay respuestas buenas ni malas.

	Nunca	A veces	A menudo	Siempre
1. Me siento triste o decaído/a	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
2. De repente siento como si no pudiera respirar sin saber por qué	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
3. Me preocupa parecer tonto/a ante la gente	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
4. Sentiría miedo si estuviera solo/a en casa	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
5. Me preocupo mucho por las cosas	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
6. Me siento mal por tener pensamientos malos o tontos, o imágenes en mi cabeza	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
7. Me cuesta divertirme o pasarlo bien	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
8. De repente empiezo a temblar o a agitarme sin saber por qué	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
9. Me da miedo hacer las cosas mal	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
10. Estar lejos de mis padres me da miedo	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
11. Me preocupa que le ocurra algo terrible a alguno de mis familiares	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
12. Tengo que seguir comprobando que he hecho las cosas bien (como que el interruptor está apagado o la puerta cerrada)	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
13. Me siento con muy poca energía para hacer las cosas	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
14. De repente me siento muy asustado/a sin saber por qué	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
15. Me preocupa lo que otras personas piensen de mí	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
16. Si tengo que dormir solo/a siento miedo	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
17. Me preocupa que me ocurran cosas malas	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
18. Tengo pensamientos malos o tontos que no puedo quitar de mi cabeza	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Escala Revisada de Ansiedad y Depresión Infantil, versión de 30 ítems (continuación)

	Nunca	A veces	A menudo	Siempre
19. Me resulta muy difícil pensar con claridad	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
20. De repente mi corazón empieza a latir rápido sin saber por qué	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
21. Me da miedo si tengo que hablar delante de la clase	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
22. Por las mañanas al ir al colegio me da miedo separarme de mis padres	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
23. Me preocupa que me ocurra algo malo	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
24. Tengo que concentrarme en pensamientos especiales (como números o palabras) para que no ocurran cosas malas	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
25. Siento que no valgo para nada	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
26. Me preocupa que de repente me sienta asustado/a, aunque no haya nada por lo que deba tener miedo	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
27. Me asusta ponerme en ridículo delante de la gente	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
28. Sentiría miedo si tuviera que pasar la noche fuera de casa	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
29. Me preocupa lo que vaya a ocurrir	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
30. Tengo que repetir algunas cosas una y otra vez (como lavarme las manos, limpiar o colocar cosas en un orden determinado)	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Depresión

Pánico

Fobia social

Separación

Ansiedad generalizada

Obsesivo-compulsivo

Total (0 a 90)

Clave de calificación (Chorpita, en Sandín et al., 2010)

Subescala	Ítems	Rango
Depresión mayor	1, 7, 13, 19, 25	0 a 15
Trastorno de pánico	2, 8, 14, 20, 26	0 a 15
Fobia social	3, 9, 15, 21, 27	0 a 15
Ansiedad de separación	4, 10, 16, 22, 28	0 a 15
Ansiedad generalizada	5, 11, 17, 23, 29	0 a 15
Obsesivo-compulsivo	6, 12, 18, 24, 30	0 a 15
Total	Los 30	0 a 90

No hay puntos de corte para esta versión: a mayor puntaje, más síntomas. Compare cada subescala consigo misma a lo largo del tratamiento y explore en la entrevista la que sobresale. En la validación colombiana las niñas puntuaron más alto que los niños en todas las subescalas, y la de síntomas obsesivo-compulsivos fue la menos consistente. La RCADS completa, de 47 ítems y con forma para los padres, está en el sitio de su autor (Child FIRST, Universidad de California).

FUENTE Y PERMISO DE USO

Chorpita, B. F., Yim, L., Moffitt, C., Umemoto, L. A. y Francis, S. E. (2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression in children: A revised child anxiety and depression scale. Behaviour Research and Therapy, 38, 835–855 · Versión de 30 ítems en español: Sandín, B., Chorot, P., Valiente, R. M. y Chorpita, B. F. (2010). Desarrollo de una versión de 30 ítems de la Revised Child Anxiety and Depression Scale. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 15(3), 165–178, apéndice · Validación en Colombia: Barajas, H. N. y Ruiz, F. J. (2024). Validity evidence of the Revised Child Anxiety and Depression Scale-30 in Colombian children. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 24(2), 255–267. Su autor ofrece la RCADS para uso libre. El texto en español se toma del apéndice de Sandín et al. (2010), que publica los ítems y la clave de calificación de Chorpita.