

Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh

PSQI

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir la calidad del sueño del último mes en siete componentes: calidad subjetiva, tiempo que tarda en dormirse, duración, eficiencia (cuánto del tiempo en cama se duerme), perturbaciones del sueño, uso de medicación para dormir y somnolencia o desánimo durante el día. Separa a quienes duermen bien de quienes duermen mal.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola, pensando en la mayor parte de los días y noches del último mes.
2. Las preguntas 1 a 4 se responden con una hora o una cantidad; las demás, marcando una opción. La pregunta 10 no puntúa.
3. Cada componente vale de 0 a 3 según la tabla de corrección; su suma es el total, de 0 a 21.

Las siguientes preguntas hacen referencia a cómo ha dormido usted normalmente durante el último mes. Intente ajustarse en sus respuestas de la manera más exacta posible a lo ocurrido durante la mayor parte de los días y noches del último mes. ¡Muy importante! CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS

1. Durante el último mes, ¿cuál ha sido, normalmente, su hora de acostarse? hora (hh:mm)
2. ¿Cuánto tiempo habrá tardado en dormirse, normalmente, las noches del último mes? minutos
3. Durante el último mes, ¿a qué hora se ha levantado habitualmente por la mañana? hora (hh:mm)
4. ¿Cuántas horas calcula que habrá dormido verdaderamente cada noche durante el último mes? (El tiempo puede ser diferente al que usted permanezca en la cama) horas

Para cada una de las siguientes preguntas, elija la respuesta que más se ajusta a su caso. Intente contestar a TODAS las preguntas.

5. Durante el último mes, cuántas veces ha tenido usted problemas para dormir a causa de:

	Ninguna vez en el último mes	Menos de una vez a la semana	Una o dos veces a la semana	Tres o más veces a la semana
a) No poder conciliar el sueño en la primera media hora	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
b) Despertarse durante la noche o de madrugada	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
c) Tener que levantarse para ir al servicio	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
d) No poder respirar bien	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
e) Toser o roncar ruidosamente	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
f) Sentir frío	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
g) Sentir demasiado calor	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
h) Tener pesadillas o «malos sueños»	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
i) Sufrir dolores	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
j) Otras razones (por favor, descríbalas)	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (continuación)

6. Durante el último mes, ¿cómo valoraría en conjunto, la calidad de su sueño?

- ☐ Bastante bueno (0) ☐ Bueno (1) ☐ Malo (2) ☐ Bastante malo (3)

7. Durante el último mes, ¿cuántas veces habrá tomado medicinas (por su cuenta o recetadas por el médico) para dormir?

- ☐ Ninguna vez en el último mes (0) ☐ Menos de una vez a la semana (1) ☐ Una o dos veces a la semana (2)
☐ Tres o más veces a la semana (3)

8. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha sentido somnolencia mientras conducía, comía o desarrollaba alguna otra actividad?

- ☐ Ninguna vez en el último mes (0) ☐ Menos de una vez a la semana (1) ☐ Una o dos veces a la semana (2)
☐ Tres o más veces a la semana (3)

9. Durante el último mes, ¿ha representado para usted mucho problema el «tener ánimos» para realizar alguna de las actividades detalladas en la pregunta anterior?

- ☐ Ningún problema (0) ☐ Sólo un leve problema (1) ☐ Un problema (2) ☐ Un grave problema (3)

10. ¿Duerme usted solo o acompañado?

- ☐ Solo ☐ Con alguien en otra habitación ☐ En la misma habitación, pero en otra cama
☐ En la misma cama

C1 Calidad

C2 Latencia

C3 Duración

C4 Eficiencia

C5 Perturbaciones

C6 Medicación

C7 Disfunción diurna

Total (0 a 21)

Corrección: siete componentes de 0 a 3 (Buysse et al., 1989)

Componente	Cómo se calcula
C1 Calidad subjetiva	Pregunta 6, tal como se marcó (0 a 3).
C2 Latencia	Pregunta 2: hasta 15 min = 0; 16 a 30 = 1; 31 a 60 = 2; más de 60 = 3. Súmele la 5a; la suma 0 = 0, 1-2 = 1, 3-4 = 2, 5-6 = 3.
C3 Duración	Pregunta 4: más de 7 h = 0; de 6 a 7 = 1; de 5 a 6 = 2; menos de 5 = 3.
C4 Eficiencia	Horas dormidas (4) ÷ horas en cama (de la hora de acostarse, 1, a la de levantarse, 3) × 100: 85 % o más = 0; 75 a 84 = 1; 65 a 74 = 2; menos de 65 = 3.
C5 Perturbaciones	Suma de 5b a 5j: 0 = 0; 1 a 9 = 1; 10 a 18 = 2; 19 a 27 = 3.
C6 Medicación	Pregunta 7, tal como se marcó.
C7 Disfunción diurna	Suma de 8 y 9: 0 = 0; 1-2 = 1; 3-4 = 2; 5-6 = 3.
Total	Suma de los siete. Más de 5: mala calidad de sueño.

El corte de 5 es el del original y lo conservó la versión castellana. Un total alto no dice la causa: revise qué componentes suben (latencia, despertares, medicación, somnolencia) para orientar la evaluación.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R. y Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research*, 28, 193–213 · Versión castellana: Royuela, A. y Macías, J. A. (1997). Propiedades clinimétricas de la versión castellana del cuestionario de Pittsburgh. *Vigilia-Sueño*, 9, 81–94; texto de Bobes García, J. et al. Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica, sección 8.2.2. Los derechos son de la Universidad de Pittsburgh, que permite reproducirlo sin costo para uso clínico y educativo sin modificar el formulario. Se reproduce con la copia del docente.