

Escala de Síntomas Somáticos (SSS-8)

SSS-8

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir la carga de síntomas somáticos de la última semana: digestivos, dolor de espalda, de extremidades, de cabeza y de pecho o falta de aire, mareo, cansancio y sueño. Sirve para tamizar y seguir el trastorno de síntomas somáticos.

CÓMO SE APLICA

1. La persona la responde sola, pensando en los últimos 7 días.
2. Cada síntoma vale de 0 (nada) a 4 (mucho). Se suman los ocho: el total va de 0 a 32.

Durante los últimos 7 días, ¿cuánto le han molestado cualquiera de los siguientes problemas?

	Nada	Un poco	Algo	Bastante	Mucho
1. Problemas estomacales o intestinales	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
2. Dolor de espalda	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
3. Dolor en brazos, piernas o articulaciones	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
4. Dolores de cabeza	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
5. Dolor en el pecho o dificultad para respirar	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
6. Mareos	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
7. Se siente cansado o que tiene baja energía	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
8. Problemas para dormir	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Total (0 a 32)

Carga de síntomas

Carga de síntomas somáticos (Gierk et al., 2014)

Puntaje	Carga
0 a 3	Nada o mínima
4 a 7	Baja
8 a 11	Media
12 a 15	Alta
16 a 32	Muy alta

La carga alta no dice si hay una causa médica: descártela antes y mire, junto con los síntomas, cuánto tiempo y preocupación les dedica la persona.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Gierk, B., Kohlmann, S., Kroenke, K., Spangenberg, L., Zenger, M., Brähler, E. y Löwe, B. (2014). The Somatic Symptom Scale-8 (SSS-8): A brief measure of somatic symptom burden. JAMA Internal Medicine, 174(3), 399–407 · Traducción publicada en MedicalCRITERIA.com. El permiso de reproducción está por confirmar. Se reproduce con la copia del docente; la traducción no está validada en español.