

Columbia-Escala de Severidad Suicida, versión exploratoria reciente

C-SSRS

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar el riesgo suicida en una entrevista breve: seis preguntas directas, de sí o no, que van del deseo de estar muerto a la ideación con intención y plan, y a la conducta suicida. La respuesta afirmativa de color más alto indica el nivel de riesgo y qué tan urgente es actuar.

CÓMO SE APLICA

1. La aplica el profesional en entrevista. Lea las preguntas en negrilla tal como están escritas; el texto de apoyo que sigue a algunas sirve para decidir si la respuesta es «Sí».
2. Formule siempre las preguntas 1, 2 y 6. Las preguntas 3, 4 y 5 solo si la 2 es «Sí». Si la 6 es «Sí», pregunte si fue en los últimos 3 meses.
3. No se suma: el nivel lo da el color más alto marcado en «Sí». Cualquier «Sí» pide seguir el protocolo de riesgo en la misma atención.
4. En cssrs.columbia.edu están la capacitación gratuita, la versión pediátrica y la versión completa de la escala.

Formule las preguntas que están en negrilla.

	Pasado mes	
	Sí	No
Formule las preguntas 1 y 2		
1) ¿Ha deseado estar muerto(a) o poder dormirse y no despertar?	☐	☐
2) ¿Ha tenido realmente la idea de suicidarse?	☐	☐
Si la respuesta es “Sí” a la pregunta 2, formule las preguntas 3, 4, 5, y 6. Si la respuesta es “No” continúe a la pregunta 6.		
3) ¿Ha pensado en cómo llevaría esto a cabo? Esto incluye a un(a) participante que diría: “He tenido la idea de tomar una sobredosis, pero nunca hice un plan específico sobre el momento, el lugar o cómo lo haría realmente... y nunca lo haría”.	☐	☐
4) ¿Ha tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? a diferencia de “Tengo los pensamientos, pero definitivamente no haré nada al respecto”.	☐	☐
5) ¿Ha comenzado a elaborar o ha elaborado los detalles sobre cómo suicidarse? ¿Tenía intenciones de llevar a cabo este plan?	☐	☐
6) ¿Alguna vez ha hecho algo usted, comenzado a hacer algo o se ha preparado para hacer algo para terminar su vida? Ejemplos: Colectar píldoras, obtener una arma, regalar cosas de valor, escribir un testamento o carta de suicidio, sacado píldoras de la botella pero no las tragado, agarrar una arma pero ha cambiado de mente de usarla o alguien se la ha quitado de sus manos, ha subido al techo pero no ha saltado al vacío; o realmente ha tomado píldoras, ha tratado de disparar una arma, se ha cortado, ha tratado de colgarse, etc.	☐	☐
Si la respuesta es “Sí”, formule: ¿Fue esto en los últimos 3 meses?	☐	☐

■ Riesgo bajo
 ■ Riesgo moderado
 ■ Riesgo alto

Nivel de riesgo (bajo, moderado o alto)

Columbia-Escala de Severidad Suicida, versión exploratoria reciente (continuación)

Clave de colores del formato

Color	Respuesta «Sí» en	Nivel de riesgo
Amarillo	Pregunta 1 o 2	Bajo
Naranja	Pregunta 3, o pregunta 6 hace más de 3 meses	Moderado
Rojo	Pregunta 4 o 5, o pregunta 6 en los últimos 3 meses	Alto

El nivel lo da la respuesta afirmativa de color más alto, no la cantidad de respuestas afirmativas. Ante cualquier «Sí», la persona no se va sin una valoración de seguridad; con riesgo alto, la acción es el mismo día.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Posner, K., Brown, G. K., Stanley, B., Brent, D. A., Yershova, K. V., Oquendo, M. A. et al. (2011). The Columbia–Suicide Severity Rating Scale. *American Journal of Psychiatry*, 168(12), 1266–1277 · Columbia-Escala de Severidad Suicida (C-SSRS), versión exploratoria - reciente, español de EE. UU. The Columbia Lighthouse Project: <https://cssrs.columbia.edu>. Según el Columbia Lighthouse Project, la escala y su capacitación son gratuitas para uso en contextos comunitarios y de atención en salud, y en investigación sin ánimo de lucro o con financiación federal.