

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión

HADS

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar ansiedad y depresión en personas con enfermedad física, sin los síntomas somáticos (fatiga, insomnio, pérdida de peso) que en el hospital se deben a la enfermedad y no al ánimo. Es el tamizaje más usado en psicología hospitalaria.

CÓMO SE APLICA

1. La persona la responde sola, pensando en cómo se ha sentido durante la última semana; si no puede leer, se le leen los ítems tal como están escritos.
2. Cada opción vale de 0 a 3. En varios ítems la escala está invertida: se suma el valor que acompaña a la opción marcada, no su posición.
3. Se suman por separado los siete ítems A (ansiedad) y los siete ítems D (depresión), de 0 a 21 cada uno. El total de los catorce no se usa como medida de gravedad.

Los médicos conocen la importancia de los factores emocionales en la mayoría de enfermedades. Si el médico sabe cuál es el estado emocional del paciente puede prestarle entonces mejor ayuda. Este cuestionario ha sido confeccionado para ayudar a que su médico sepa cómo se siente usted afectiva y emocionalmente. No es preciso que preste atención a los números que aparecen a la izquierda. Lea cada pregunta y subraye la respuesta que usted considere que coincide con su propio estado emocional en la última semana. No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta; en este cuestionario las respuestas espontáneas tienen más valor que las que se piensan mucho.

A.1. Me siento tenso/a o nervioso/a

- ☐ Casi todo el día (3) ☐ Gran parte del día (2) ☐ De vez en cuando (1) ☐ Nunca (0)

D.1. Sigo disfrutando de las cosas como siempre

- ☐ Ciertamente, igual que antes (0) ☐ No tanto como antes (1) ☐ Solamente un poco (2)
☐ Ya no disfruto con nada (3)

A.2. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder

- ☐ Sí, y muy intenso (3) ☐ Sí, pero no muy intenso (2) ☐ Sí, pero no me preocupa (1) ☐ No siento nada de eso (0)

D.2. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas

- ☐ Igual que siempre (0) ☐ Actualmente, algo menos (1) ☐ Actualmente, mucho menos (2)
☐ Actualmente, en absoluto (3)

A.3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones

- ☐ Casi todo el día (3) ☐ Gran parte del día (2) ☐ De vez en cuando (1) ☐ Nunca (0)

D.3. Me siento alegre

- ☐ Nunca (3) ☐ Muy pocas veces (2) ☐ En algunas ocasiones (1) ☐ Gran parte del día (0)

A.4. Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y relajado/a

- ☐ Siempre (0) ☐ A menudo (1) ☐ Raras veces (2) ☐ Nunca (3)

D.4. Me siento lento/a y torpe

- ☐ Gran parte del día (3) ☐ A menudo (2) ☐ A veces (1) ☐ Nunca (0)

A.5. Experimento una desagradable sensación de «nervios y hormigueos» en el estómago

- ☐ Nunca (0) ☐ Sólo en algunas ocasiones (1) ☐ A menudo (2) ☐ Muy a menudo (3)

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (continuación)

D.5. He perdido el interés por mi aspecto personal

- ☐ Completamente (3) ☐ No me cuido como debería hacerlo (2) ☐ Es posible que no me cuido como debiera (1)
☐ Me cuido como siempre lo he hecho (0)

A.6. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme

- ☐ Realmente mucho (3) ☐ Bastante (2) ☐ No mucho (1) ☐ En absoluto (0)

D.6. Espero las cosas con ilusión

- ☐ Como siempre (0) ☐ Algo menos que antes (1) ☐ Mucho menos que antes (2) ☐ En absoluto (3)

A.7. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor

- ☐ Muy a menudo (3) ☐ Con cierta frecuencia (2) ☐ Raramente (1) ☐ Nunca (0)

D.7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión

- ☐ A menudo (0) ☐ Algunas veces (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Casi nunca (3)

Ansiedad: ítems A (0 a 21)

Depresión: ítems D (0 a 21)

Interpretación de los autores, por subescala

Puntaje	Interpretación
0 a 7	Sin caso
8 a 10	Caso dudoso
11 a 21	Caso probable

Cada subescala se interpreta por separado. Un caso probable pide una entrevista clínica; en paciente con enfermedad física, confirme que el malestar no se explica mejor por la enfermedad o su tratamiento.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Zigmond, A. S. y Snaith, R. P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 67(6), 361–370 · Versión en español: Bobes García, J., G.-Portilla, M. P., Bascarán Fernández, M. T., Sáiz Martínez, P. A. y Bousoño García, M. Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica, sección 5.7. Los derechos de la HADS son de GL Assessment, que licencia su uso.