INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CON LICENCIA

Inventario de Depresión Infantil

CDI

Nombre | Fecha | Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir la sintomatología depresiva de las dos últimas semanas en niños y adolescentes de 7 a 15 años: tristeza, anhedonia, autoestima, pesimismo, problemas escolares y sociales, sueño, apetito e ideas de muerte. Sirve para tamizar en colegios y consulta, y para seguir el tratamiento.

CÓMO SE APLICA

1. Lo responde el niño solo o con lectura en voz alta del examinador (entre 10 y 20 minutos). En cada grupo marca la frase que mejor describe cómo se ha sentido en las dos últimas semanas.
2. Cada grupo vale de 0 a 2. Disforia suma 16 grupos (0 a 32), Autoestima negativa 11 (0 a 22) y el total los 27 (0 a 54).

Hoja de respuestas: aplique la prueba con su protocolo original y anote aquí la respuesta de cada ítem. Esta hoja no reproduce los ítems, cuyos derechos son del editor.

Ítem 1

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 2

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 3

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 4

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 5

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 6

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 7

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 8

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 9

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 10

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 11

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 12

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 13

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Fuente: Kovacs (1992) · edición española de del Barrio y Carrasco (TEA Ediciones, 2004).

Inventario de Depresión Infantil (continuación)

Ítem 14

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 15

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 16

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 17

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 18

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 19

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 20

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 21

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 22

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 23

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 24

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 25

☐ 2 (2) ☐ 1 (1) ☐ 0 (0)

Ítem 26

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Ítem 27

☐ 0 (0) ☐ 1 (1) ☐ 2 (2)

Disforia (0 a 32)	Autoestima negativa (0 a 22)	Total (0 a 54)

Escalas y punto de corte (manual de TEA)

Puntaje	Qué indica
Disforia	Grupos 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25 y 27: ánimo triste, llanto, anhedonia, sueño, apetito, cansancio, soledad, ideas de muerte.
Autoestima negativa	Grupos 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 24 y 26: pesimismo, ineficacia, preocupación, indecisión, imagen de sí.
Total de 19 o más	Punto de corte más usado en población española y extranjera (Del Barrio, 1997): sintomatología depresiva que pide evaluación clínica.

Fuente: Kovacs (1992) · edición española de del Barrio y Carrasco (TEA Ediciones, 2004).

Inventario de Depresión Infantil (continuación)

Cada grupo vale 0, 1 o 2 según la intensidad de la frase elegida; el orden de las frases cambia de un grupo a otro para evitar respuestas automáticas, así que califique con la clave y no por la posición. Revise siempre el grupo 9 (ideas de matarse): cualquier respuesta que no sea la de 0 puntos pide valorar el riesgo en la misma sesión, sea cual sea el total. Los percentiles por edad y sexo están en las tablas de baremos del manual. El CDI estima síntomas, no hace el diagnóstico.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Kovacs, M. (1992). Children's Depression Inventory. Multi-Health Systems · Edición española: del Barrio, V. y Carrasco, M. Á. (2004). CDI. Inventario de Depresión Infantil. TEA Ediciones · Del Barrio, V. (1997). Estudio sobre la depresión en población española (punto de corte). © 1982 Maria Kovacs; © 1991, 1992 Multi-Health Systems; edición española © 2004 TEA Ediciones. Prueba comercial: se usa con los ejemplares comprados. Esta es la hoja de respuestas publicada; la versión con los ítems es solo de uso personal del docente.