MI GUÍA

# Mis ejercicios para los tics


Un ejercicio que hace tu cuerpo en lugar del tic y que no deja que el tic salga al mismo tiempo. Lo haces apenas sientes la señal que avisa que viene un tic, o apenas empieza.

1. Elige con tu terapeuta un ejercicio para cada tic: que no se note mucho y que lo puedas hacer en cualquier parte.
2. Practícalo primero en la consulta y en la casa, hasta que te salga fácil.
3. Anótalo en tu hoja de tics, señales y ejercicios.

## Cómo se usa

1. Fíjate en la señal: la sensación o las ganas que aparecen justo antes del tic.
2. Apenas la notes, o apenas empiece el tic, haz tu ejercicio.
3. Sostenlo un minuto, o hasta que las ganas se vayan si tardan más.
4. Pregúntate: ¿siguen las ganas? Si siguen, continúa un rato más.

## Algunos ejercicios




### 1 Manos en las rodillas

Para tics de las manos o de los dedos: apoya las manos en las rodillas y aprieta un poco.



### 2 Brazos cruzados

Para tics de los brazos o de crujir los dedos: cruza los brazos y mantenlos cerca.



### 3 Cuello firme

Para tics de la cabeza: baja un poco la barbilla, tensa suave el cuello y mira un punto fijo.



### 4 Respirar despacio

Para tics de sonidos: respira lento desde la barriga, con los hombros quietos.

## Para tu ayudante en casa

*El ayudante, casi siempre un papá o una mamá, tiene dos tareas: felicitarte cuando haces bien tu ejercicio («¡bien hecho!») y recordártelo con calma cuando se te olvida. No te pregunta por los tics, no te regaña por tenerlos ni te premia por no tenerlos: todo es para ayudarte con los ejercicios.*


Basada en: Woods et al. (2008), cap. 4, «Competing Response Training», tabla 4.1, y «Social Support».