

Cuestionario de Aceptación y Acción II

AAQ-II

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir la inflexibilidad psicológica y la evitación experiencial: cuánto se lucha contra los pensamientos, emociones y recuerdos difíciles, y cuánto esa lucha estorba la vida que la persona quiere. Es la medida de proceso central de la terapia de aceptación y compromiso.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola, marcando un número por afirmación. Si no puede leer, se le leen las afirmaciones tal como están escritas.
2. Se suman los valores marcados según el modo de corrección de abajo.
3. Puntajes altos no diagnostican: indican que la evitación es un blanco de trabajo. Repítalo a lo largo del tratamiento para ver si baja.

Debajo encontrará una lista de afirmaciones. Por favor, puntúe en qué grado cada afirmación ES VERDAD PARA USTED haciendo un círculo en los números de al lado. Utilice la siguiente escala para hacer su elección.

	Nunca es verdad	Muy raramente es verdad	Raramente es verdad	A veces es verdad	Frecuentemente es verdad	Casi siempre es verdad	Siempre es verdad
1. Mis experiencias y recuerdos dolorosos hacen que me sea difícil vivir la vida que querría.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
2. Tengo miedo de mis sentimientos.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
3. Me preocupa no ser capaz de controlar mis preocupaciones y sentimientos.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
4. Mis recuerdos dolorosos me impiden llevar una vida plena.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
5. Mis emociones interfieren en cómo me gustaría que fuera mi vida.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
6. Parece que la mayoría de la gente lleva su vida mejor que yo.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
7. Mis preocupaciones interfieren en el camino de lo que quiero conseguir.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7

Puntaje total (7 a 49)

Modo de corrección e interpretación

Suma de las puntuaciones obtenidas en cada ítem. A mayor puntuación, mayor grado de evitación experiencial. Las puntuaciones promedio de los participantes sin problema clínico suelen estar en torno a 18 y 23 puntos. Las puntuaciones promedio de los participantes clínicos son superiores a 29 puntos.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A. et al. (2011). Behavior Therapy, 42, 676–688. Validación en Colombia: Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., Cárdenas-Sierra, S., Durán, Y. A., Guerrero, K. y Riaño-Hernández, D. (2016). The Psychological Record, 66, 429–437. Versión y formato: KlinikLab, Fundación Universitaria Konrad Lorenz (la.konradlorenz.edu.co/cliniklab-recursos), que autoriza su uso «para fines investigativos, clínicos, educativos, etc., sin que sea necesario solicitar permiso».