

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión

HADS

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar ansiedad y depresión en personas con enfermedad física, sin los síntomas somáticos (fatiga, insomnio, pérdida de peso) que en el hospital se deben a la enfermedad y no al ánimo. Es el tamizaje más usado en psicología hospitalaria.

ANTES DE USARLO

1. Sus derechos son de GL Assessment, que la licencia. BiblioPRO la registra con «gestión externa»: el permiso se tramita con el titular.
2. Se aplica con la versión adquirida o autorizada, sin cambiar la redacción de los ítems.
3. Si no se cuenta con ella, use la alternativa libre que aparece al final.

Qué mide	Dos subescalas de siete ítems cada una: ansiedad (HADS-A) y depresión (HADS-D), esta centrada en la anhedonia. Referidas a la última semana.
Población	Adolescentes y adultos con enfermedad física, en hospital y consulta externa.
Formato	14 ítems con cuatro opciones puntuadas de 0 a 3.
Aplicación	Autoaplicada, de 2 a 5 minutos.
Calificación	Cada subescala suma de 0 a 21 y se interpreta por separado; no se recomienda usar el total como medida de gravedad.
Cómo se consigue	Se licencia con GL Assessment, titular de los derechos.

Interpretación de los autores, por subescala

Puntaje	Interpretación
0 a 7	Sin caso
8 a 10	Caso dudoso
11 a 21	Caso probable

ALTERNATIVA DE ACCESO LIBRE

PHQ-9 y GAD-7, de libre reproducción y con versión oficial para Colombia; su ficha completa está en la guía de tamizaje. En paciente con enfermedad física interprete con cuidado los ítems de sueño, apetito y energía del PHQ-9, que pueden deberse a la enfermedad.

Esta ficha no reproduce los ítems de la HADS. Resume datos publicados sobre el instrumento para orientar su elección.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Zigmond, A. S. y Snaith, R. P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67(6), 361–370.