

Escala de Malestar Psicológico de Kessler

K-10

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar malestar psicológico inespecífico del último mes, sobre todo síntomas de ansiedad y depresión. Es breve, se usa en encuestas poblacionales de muchos países y sirve en atención primaria como primera puerta cuando todavía no hay una hipótesis.

CÓMO SE APLICA

1. La persona marca una opción por pregunta, pensando en el último mes. Esta adaptación trata de «tú»; si lo aplica en entrevista, puede leerla tal cual.
2. Se suman las 10 respuestas (10 a 50) y se ubica el total en la tabla.

Las siguientes preguntas describen formas en que la gente actúa o se siente. Marca la opción que mejor se adecue a tu situación actual, teniendo en cuenta el último mes (Por favor, marca una respuesta para cada inciso, si estás inseguro haz tu mejor estimación).

En el último mes	Nunca	Pocas veces	A veces	Muchas veces	Siempre
1. ¿Con qué frecuencia te has sentido cansado, sin alguna buena razón?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
2. ¿Con qué frecuencia te has sentido nervioso?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
3. ¿Con qué frecuencia te has sentido tan nervioso que nada te podía calmar?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
4. ¿Con qué frecuencia te has sentido desesperado?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
5. ¿Con qué frecuencia te has sentido inquieto o intranquilo?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
6. ¿Con qué frecuencia te has sentido tan impaciente que no has podido mantenerte quieto?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
7. ¿Con qué frecuencia te has sentido deprimido?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
8. ¿Con qué frecuencia has sentido que todo lo que haces representa un gran esfuerzo?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
9. ¿Con qué frecuencia te has sentido tan triste que nada podía animarte?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
10. ¿Con qué frecuencia te has sentido un inútil?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

Puntaje total (10 a 50)

Nivel de malestar

Calificación e interpretación (Andrews y Slade, 2001)

Puntaje	Malestar psicológico
10 a 15	Bajo
16 a 21	Moderado
22 a 29	Alto
30 a 50	Muy alto

Escala de Malestar Psicológico de Kessler (continuación)

Los puntos de corte vienen de población australiana; antes de sostener uno en Colombia, revise la validación latinoamericana disponible. El K-10 no pregunta por riesgo suicida: si el malestar es alto, pregunte directamente.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Kessler, R. C., Andrews, G., Colpe, L. J. et al. (2002). Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. *Psychological Medicine*, 32(6), 959–976. Adaptación al castellano: Grupo LISIS (2011). Puntos de corte: Andrews, G. y Slade, T. (2001). *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 25(6), 494–497. Las escalas K6 y K10 son de uso libre y sin costo según su autor; la adaptación se publica en abierto en el sitio del Grupo LISIS (Universitat de València).