

CRAFFT 2.1+N

CRAFFT

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar el consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en adolescentes de 12 a 21 años, con una parte de dependencia a la nicotina y al vaporizador. Sirve para decidir si hace falta una evaluación completa y para el consejo breve.

CÓMO SE APLICA

1. Es una entrevista breve: el profesional lee las preguntas en el orden de la hoja.
2. La parte A cuenta días de consumo y decide qué más preguntar. El puntaje CRAFFT es el número de «sí» en la parte B (0 a 6).

Entrevista que el profesional hace de forma oral. Comienzo: “Te voy a hacer algunas preguntas que les hago a todos los pacientes. Por favor responde sinceramente. Tus respuestas serán confidenciales”

Parte A · Durante los últimos 12 meses, cuántos días:

1. ¿Has bebido algo más que unos sorbos de cerveza, vino o alguna bebida con alcohol? días
Di “0” si la respuesta es ninguno.
2. ¿Has usado algún tipo de marihuana (cannabis, aceite, cera, para fumar, vaporizar, fumar dosis muy concentradas o “dabs” o en los alimentos) o “marihuana sintética” (como “K2”, “Spice”)? Di “0” si la respuesta es ninguno. días
3. ¿Has usado algo más para drogarte (como otras drogas ilegales, medicamentos recetados o de venta libre, y cosas para inhalar, esnifar, vaporizar o inyectarse)? Di “0” si la respuesta es ninguno. días
4. ¿Has usado un dispositivo vaporizador* que contiene nicotina o sabores, o algún producto de tabaco? Di “0” si la respuesta es ninguno. * Como cigarrillos electrónicos, “mods”, dispositivos “pod” como JUUL, vaporizadores descartables como Puff Bar, vaporizadores tipo bolígrafo o pipas de agua electrónicas. Pitillos, cigarros, cigarrillos, pipas, tabaco de mascar, tabaco rapé, “snus” o solubles. días

Si respondió 0 en todas las preguntas de la parte A, haga solo la primera pregunta de la parte B (CAR) y deténgase. Con 1 o más en las preguntas 1, 2 o 3, haga las 6 preguntas de la parte B. Con 1 o más en la pregunta 4, haga las 10 de la parte C.

Parte B

C (CAR). ¿Alguna vez has viajado en un vehículo (CAR) conducido por alguien (incluido/a tú mismo/a) que estaba drogado o que había consumido alcohol o drogas?

☐ No (0) ☐ Sí (1)

R (RELAX). ¿Alguna vez consumes alcohol o drogas para relajarte (RELAX), sentirte mejor contigo mismo/a o integrarte en un grupo?

☐ No (0) ☐ Sí (1)

A (ALONE). ¿Alguna vez consumes alcohol o drogas cuando estás solo/a (ALONE) o sin compañía?

☐ No (0) ☐ Sí (1)

F (FORGET). ¿Alguna vez te olvidas (FORGET) de cosas que has hecho mientras consumías alcohol o drogas?

☐ No (0) ☐ Sí (1)

F (FAMILY/FRIENDS). ¿Tus familiares o amigos (FAMILY or FRIENDS) alguna vez te dicen que deberías disminuir el consumo de alcohol o drogas?

☐ No (0) ☐ Sí (1)

CRAFFT 2.1+N (continuación)

T (TROUBLE). ¿Alguna vez te has metido en problemas (TROUBLE) al consumir alcohol o drogas?

☐ No (0) ☐ Sí (1)

Parte C · Vaporizador y tabaco

1. ¿Alguna vez has intentado DEJAR de consumir, pero no pudiste?

☐ Sí (1) ☐ No (0)

2. ¿ACTUALMENTE usas vaporizador o tabaco porque te resulta muy difícil dejar de consumir?

☐ Sí (1) ☐ No (0)

3. ¿Alguna vez has sentido que eres ADICTO/A al vaporizador o al tabaco?

☐ Sí (1) ☐ No (0)

4. ¿Alguna vez sientes muchas GANAS de usar vaporizador o tabaco?

☐ Sí (1) ☐ No (0)

5. ¿Alguna vez has sentido que realmente NECESITABAS usar vaporizador o tabaco?

☐ Sí (1) ☐ No (0)

6. ¿Te resulta difícil evitar usar vaporizador o tabaco en LUGARES donde supuestamente no debes hacerlo, como la escuela?

☐ Sí (1) ☐ No (0)

7. CuandoNO HAS USADO vaporizador o tabaco durante un tiempo (o cuando has intentado dejar de usarlo)...

7a. ¿te resultó difícil CONCENTRARTE porque no podías usar vaporizador o tabaco?

☐ Sí (1) ☐ No (0)

7b. ¿te sentiste más IRRITABLE porque no podías usar vaporizador o tabaco?

☐ Sí (1) ☐ No (0)

7c. ¿sentiste NECESIDAD o ganas intensas de usar vaporizador o tabaco?

☐ Sí (1) ☐ No (0)

7d. ¿te sentiste NERVIOSO/A, inquieto/a o ansioso/a porque no podías usar vaporizador o tabaco?

☐ Sí (1) ☐ No (0)

Puntaje CRAFFT (parte B, 0 a 6)

Parte C: respuestas «sí»

Probabilidad de un trastorno por consumo según el puntaje (Mitchell et al., 2014)

Puntaje CRAFFT	Probabilidad
1	32 %
2	64 %
3	79 %
4	92 %
5	100 %
6	100 %

Dos o más respuestas «sí» en la parte B sugieren un problema serio con el consumo y piden seguir evaluando; una o más en la parte C, un problema serio con la nicotina. El formato propone cerrar con el consejo breve de las 5 R: revisar, recomendar no consumir, reflexionar sobre conducir, respuesta motivacional y reforzar.

CRAFFT 2.1+N (continuación)

FUENTE Y PERMISO DE USO

Knight, J. R., Sherritt, L., Shrier, L. A., Harris, S. K. y Chang, G. (2002). Validity of the CRAFFT substance abuse screening test among adolescent clinic patients. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 156, 607–614 · CRAFFT 2.1+N, © John R. Knight, Boston Children's Hospital, 2020, versión en español · Interpretación: Mitchell, S. G. et al. (2014). *Substance Abuse*, 35(4), 376–380. © John R. Knight, MD, Boston Children's Hospital, 2020. Su reproducción en otro formato pide la aprobación del Center for Adolescent Behavioral Health Research (crafft@childrens.harvard.edu). Se reproduce con la copia del docente, bajo su responsabilidad.