

Escala de Activación Conductual para la Depresión, versión breve

BADS-SF

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir cuánto se activó la persona durante la última semana y cuánto evitó: las dos caras que trabaja la activación conductual. Es sensible al cambio y se aplica sesión a sesión.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola, marcando un número por afirmación.
2. Para el puntaje general, los ítems 1, 6, 7 y 8 (Evitación) se invierten (0 = 6, 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1, 6 = 0) y después se suman los nueve.

Lea cuidadosamente cada afirmación y luego encierre en un círculo el número que mejor describa la afirmación que le correspondió DURANTE LA SEMANA PASADA, INCLUIDO HOY.

	No, en absoluto		Un poco		Mucho		Completamente
1. Hubo ciertas cosas que tenía que hacer pero que al final no hice.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
2. Estoy contento/a con la cantidad y el tipo de cosas que hice.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
3. Participé en diferentes actividades	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
4. Tomé buenas decisiones sobre el tipo de actividades y situaciones en las que participé.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
5. Fui una persona activa y cumplí los objetivos que me propuse.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
6. La mayor parte de lo que hice fue para escapar o evitar algo desagradable.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
7. Pasé mucho tiempo pensando una y otra vez sobre mis problemas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
8. Hice actividades para distraerme y evitar sentirme mal.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
9. Hice cosas agradables.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6

Activación (2, 3, 4, 5 y 9)

Evitación (1, 6, 7 y 8)

Total, con Evitación invertida (0 a 54)

Modo de corrección e interpretación

Suma de las puntuaciones obtenidas en cada ítem. Está compuesto por dos factores: Evitación (ítems 1, 6, 7 y 8), que corresponde a los ítems negativos o de calificación inversa para la escala general, y Activación (ítems 2, 3, 4, 5 y 9). A mayor puntuación, mayor grado de activación. Las puntuaciones promedio de dos muestras de población general colombiana suelen situarse en torno a los 35 puntos.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Manos, R. C., Kanter, J. W. y Luo, W. (2011). Behavior Therapy, 42(4), 726–739. Validación en Colombia: García, D., Bianchi-Salguero, J. y Montoya, C. (2019), tesis de maestría, Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Versión y formato: KlinikLab, Fundación Universitaria Konrad Lorenz (la.konradlorenz.edu.co/cliniklab-recursos), que autoriza su uso «para fines investigativos, clínicos, educativos, etc., sin que sea necesario solicitar permiso».