

Lista de Verificación del Trastorno de Estrés Postraumático para el DSM-5

PCL-5

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar y medir la gravedad de los síntomas de estrés postraumático del último mes. Sus 20 ítems siguen los 20 síntomas del DSM-5, agrupados en intrusión, evitación, alteraciones negativas de cognición y ánimo, y activación. Sirve para tamizar, para apoyar un diagnóstico provisional y para seguir el cambio.

CÓMO SE APLICA

1. Antes de aplicarlo, pida a la persona que identifique la experiencia estresante a la que se refieren sus respuestas.
2. Se suman los 20 ítems (0 a 80). También se puede sumar cada grupo de síntomas por separado (ver abajo).
3. Un puntaje sobre el corte no es un diagnóstico: pide una entrevista clínica.

Más abajo hay un listado de problemas que las personas tienen a veces debido a una experiencia muy estresante. Lea por favor cada problema detenidamente y después rodee uno de los números de la derecha para indicar con cuánta intensidad le ha molestado aquel problema durante el último mes.

Experiencia estresante a la que se refieren las respuestas

En el último mes, ¿cuánto le ha molestado	Nada	Un poco	Moderadamen- te	Bastante	Muchísimo
1. Tener recuerdos repetidos, perturbadores y no deseados de la experiencia estresante?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
2. Tener sueños repetidos, perturbadores de la experiencia estresante?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
3. Sentirse o actuar de repente como si la experiencia estresante volviera a suceder (como si realmente estuviera allí reviviéndolo)?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
4. Sentirse muy disgustado cuando algo le recordaba la experiencia estresante?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
5. Tener reacciones físicas intensas cuando algo le recordaba la experiencia estresante (p.ej. palpitaciones, dificultades para respirar, sudoración)?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
6. Evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos relacionados con la experiencia estresante?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
7. Evitar estímulos externos relacionados con la experiencia estresante (p.ej. personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos o situaciones)?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
8. Tener dificultades para recordar partes importantes de la experiencia estresante?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
9. Tener fuertes creencias negativas sobre uno mismo, otras personas, o el mundo (p.ej. tener pensamientos como: no soy una buena persona, hay algo que seriamente no está bien en mí, no se puede confiar en nadie, el mundo es muy peligroso)?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
10. Culparse a sí mismo o a otra persona de la experiencia estresante o de lo que sucedió después?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
11. Tener fuertes sentimientos negativos tales como miedo, terror, ira, culpa o vergüenza?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Lista de Verificación del Trastorno de Estrés Postraumático para el DSM-5 (continuación)

En el último mes, ¿cuánto le ha molestado	Nada	Un poco	Moderadamen- te	Bastante	Muchísimo
12. Perder el interés en actividades que antes solía disfrutar?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
13. Sentirse distante o apartado de los demás?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
14. Dificultades para sentir emociones positivas (p.ej. ser incapaz de sentir alegría o tener sentimientos de amor hacia personas cercanas)?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
15. Tener conductas irritables, ataques de ira o actuar de manera agresiva?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
16. Tomar demasiados riesgos o hacer cosas que le pudieran dañar?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
17. Estar muy en alerta o en guardia?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
18. Sentirse asustadizo o sobresaltado?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
19. Tener dificultades para concentrarse?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
20. Tener problemas para dormir o mantener el sueño?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Intrusión (1-5)	Evitación (6-7)	Cognición y ánimo (8-14)	Activación (15-20)	Total (0-80)

Calificación e interpretación (National Center for PTSD)

Criterio	Qué indica
Total de 31 a 33 o más	Probable trastorno de estrés postraumático: confirme con una entrevista clínica. El corte exacto depende de la población; en tamizaje amplio se prefiere el más bajo.
Diagnóstico provisional	Se cuenta como presente todo ítem puntuado 2 (Moderadamente) o más, y se sigue la regla del DSM-5: al menos 1 ítem de intrusión (1-5), 1 de evitación (6-7), 2 de cognición y ánimo (8-14) y 2 de activación (15-20).
Cambio con el tratamiento	Una baja de 10 a 20 puntos se considera cambio clínicamente significativo.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Weathers, F. W., Litz, B. T., Keane, T. M., Palmieri, P. A., Marx, B. P. y Schnurr, P. P. (2013). The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). National Center for PTSD. Traducción al español aprobada por el proyecto CENTER-TBI (Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI). El PCL-5 es del National Center for PTSD del gobierno de los Estados Unidos, de dominio público.