

Cuestionario de Preocupación de Pensilvania, versión de 11 ítems

PSWQ-11

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir la tendencia a preocuparse: cuánto, con qué frecuencia y con cuánta dificultad para detenerlo. Es el rasgo central del trastorno de ansiedad generalizada. Esta versión breve está validada en Colombia y tiene puntos de corte para TAG moderado y grave.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola, marcando un número por afirmación. Si no puede leer, se le leen las afirmaciones tal como están escritas.
2. Se suman los valores marcados. Es una medida de rasgo: sirve más al inicio y al final del tratamiento que semana a semana.

Utilizando la siguiente escala indique hasta qué punto se identifica con cada una de las situaciones que vamos a presentarle a continuación, referidas al modo que tienen las personas de preocuparse.

	Nada	Algo	Regular	Bastante	Mucho
1. Me agobian mis preocupaciones.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
2. Son muchas las circunstancias que hacen que me sienta preocupado/a.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
3. Sé que no debería estar tan preocupado/a por las cosas, pero no puedo hacer nada por evitarlo.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
4. Cuando estoy bajo estados de tensión tiendo a preocuparme muchísimo.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
5. Siempre estoy preocupado/a por algo.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
6. Tan pronto como termino una tarea, enseguida empiezo a preocuparme sobre alguna otra cosa que debo hacer.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
7. Toda mi vida he sido una persona muy preocupada.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
8. Soy consciente de que me he preocupado excesivamente por las cosas.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
9. Una vez que comienzan mis preocupaciones no puedo detenerlas.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
10. Estoy preocupado/a constantemente.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
11. Cuando tengo algún proyecto no dejo de preocuparme hasta haberlo efectuado.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

Puntaje total (11 a 55)

Interpretación

Cuestionario de Preocupación de Pensilvania, versión de 11 ítems (continuación)

Modo de corrección e interpretación

Puntaje	Interpretación
Menos de 33	Por debajo del punto de corte para TAG.
33 a 37	Punto de corte para identificar un trastorno de ansiedad generalizada moderado.
38 o más	Punto de corte para identificar un trastorno de ansiedad generalizada severo.

Suma de las puntuaciones obtenidas en cada ítem. A mayor puntuación, mayor grado de preocupación. Un puntaje sobre el corte orienta la entrevista; el diagnóstico de TAG exige los demás criterios.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L. y Borkovec, T. D. (1990). Behaviour Research and Therapy, 28, 487–495. Validación en Colombia: Ruiz, F. J., Monroy-Cifuentes, A. y Suárez-Falcón, J. C. (2018). Anales de Psicología, 34, 451–457. Versión y formato: KlinikLab, Fundación Universitaria Konrad Lorenz (la.konradlorenz.edu.co/cliniklab-recursos), que autoriza su uso «para fines investigativos, clínicos, educativos, etc., sin que sea necesario solicitar permiso».