FICHA DE TRABAJO · COGNITIVO-CONDUCTUAL

Prueba de inducción de sensaciones

Nombre | Fecha | Sesión

PARA QUÉ SIRVE

Probar, con el terapeuta, qué ejercicios producen sensaciones parecidas a las del pánico. Los que se parezcan (3 o más en la última columna) se usan después para practicar la exposición a esas sensaciones.

CÓMO SE LLENA

1. El terapeuta muestra primero cada ejercicio; luego usted lo hace durante el tiempo indicado.
2. Al terminar, anote las sensaciones que notó y puntúe de 0 a 10 la ansiedad, la intensidad de las sensaciones y cuánto se parecen a las de una crisis.
3. Si tiene asma, problemas del corazón, embarazo u otra condición médica, consulte antes con su médico qué ejercicios puede hacer.

Ejercicio	Sensaciones que noté	Ansiedad (0 a 10)	Intensidad (0 a 10)	Parecido con una crisis (0 a 10)
Sacudir la cabeza de lado a lado, 30 segundos				
Cabeza entre las rodillas 30 segundos y levantarla de golpe				
Correr en el sitio o subir escalones, 1 minuto				
Contener la respiración todo lo posible				
Tensar todo el cuerpo, 1 minuto				
Girar en una silla giratoria, 1 minuto				
Respirar rápido y profundo (hiperventilar), 1 minuto				
Respirar por una pajilla con la nariz tapada, 2 minutos				
Mirar fijo un punto de la pared o su reflejo, 90 segundos				
Otro:				

Basada en: Craske y Barlow (2014), en Barlow (Ed.), cap. 1 (exposición interoceptiva, sesión 5).

Cómo se hace cada ejercicio



Sacudir la cabeza de lado a lado, 30 segundos



Cabeza entre las rodillas 30 segundos y levantarla de golpe



Correr en el sitio o subir escalones, 1 minuto



Contener la respiración todo lo posible



Tensar todo el cuerpo, 1 minuto




Girar en una silla giratoria, 1 minuto



Respirar rápido y profundo (hiperventilar), 1 minuto



Respirar por una pajilla con la nariz tapada, 2 minutos



Mirar fijo un punto de la pared o su reflejo, 90 segundos

Basada en: Craske y Barlow (2014), en Barlow (Ed.), cap. 1 (exposición interoceptiva, sesión 5).