

# Series de Fourier

## 1 Series de Fourier

- Producto escalar y familias ortogonales de funciones
- Series trigonométricas de Fourier
- Convergencia
- Series de senos y cosenos de Fourier

## 1 Series de Fourier

- Producto escalar y familias ortogonales de funciones
- Series trigonométricas de Fourier
- Convergencia
- Series de senos y cosenos de Fourier

## 1 Series de Fourier

- Producto escalar y familias ortogonales de funciones
- Series trigonométricas de Fourier
- Convergencia
- Series de senos y cosenos de Fourier

# Producto escalar de funciones en un intervalo dado

## Definición

Dadas dos funciones  $f$  y  $g$  definidas en  $[a, b]$ , el **producto escalar usual** entre ellas es

# Producto escalar de funciones en un intervalo dado

## Definición

Dadas dos funciones  $f$  y  $g$  definidas en  $[a, b]$ , el **producto escalar usual** entre ellas es

$$f \cdot g = \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

# Producto escalar de funciones en un intervalo dado

## Definición

Dadas dos funciones  $f$  y  $g$  definidas en  $[a, b]$ , el **producto escalar usual** entre ellas es

$$f \cdot g = \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

Las funciones  $f$  y  $g$  son **ortogonales** en  $[a, b]$  si  $f \cdot g = 0$  en  $[a, b]$ .

## Ejemplo

Analice la ortogonalidad de las funciones dadas por  $f(x) = \sin x$  y  $g(x) = 1$  en  $[0, 2\pi]$ , en  $[0, \pi]$  y en  $[-\pi, \pi]$ .



## Ejemplo

Analice la ortogonalidad de las funciones dadas por  $f(x) = \sin x$  y  $g(x) = 1$  en  $[0, 2\pi]$ , en  $[0, \pi]$  y en  $[-\pi, \pi]$ .

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{2\pi} = 0 : f \text{ y } g \text{ son ortogonales en } [0, 2\pi];$$

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = 2 : f \text{ y } g \text{ no son ortogonales en } [0, \pi];$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0 : f \text{ y } g \text{ son ortogonales en } [-\pi, \pi].$$

## Definición

Una familia de funciones es **ortogonal** en  $[a, b]$  si cada miembro de la familia es ortogonal a cada una de las restantes funciones de la familia en  $[a, b]$ .

# Familias ortogonales de funciones

## Definición

Una familia de funciones es **ortogonal** en  $[a, b]$  si cada miembro de la familia es ortogonal a cada una de las restantes funciones de la familia en  $[a, b]$ .

## Ejemplo

Analizar la ortogonalidad de las familias  $\{1, \cos \frac{n\pi x}{p}, n = 1, 2, \dots\}$  y  $\{1, \cos \frac{n\pi x}{p}, \sin \frac{n\pi x}{p}, n = 1, 2, \dots\}$  en  $[-p, p]$  y en  $[0, 2p]$ .

## Definición

Una familia ortogonal de funciones en  $[a, b]$  es **completa** si la única función definida en  $[a, b]$  que es ortogonal a todos los miembros de la familia es la función constante 0.

## Definición

Una familia ortogonal de funciones en  $[a, b]$  es **completa** si la única función definida en  $[a, b]$  que es ortogonal a todos los miembros de la familia es la función constante 0.

## Ejemplo:

La familia  $\{\cos \frac{n\pi x}{p}, n = 0, 1, 2, 3, \dots\} = \{1, \cos \frac{n\pi x}{p}, n = 1, 2, 3, \dots\}$  es ortogonal en  $[-p, p]$  pero no es completa.

1

## Series de Fourier

- Producto escalar y familias ortogonales de funciones
- **Series trigonométricas de Fourier**
- Convergencia
- Series de senos y cosenos de Fourier

# Series trigonométricas de Fourier. Motivación

Dada la familia ortogonal de funciones en  $[-p, p]$  (o en  $[0, 2p]$ )

$$\left\{ 1, \cos \frac{n\pi x}{p}, \sin \frac{n\pi x}{p}; n = 1, 2, 3, \dots \right\},$$

se busca coeficientes  $c_0$ ,  $a_n$  y  $b_n$ ,  $n = 1, 2, \dots$  tales que

$$f(x) = c_0 \cdot 1 + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} + \dots + b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} + \dots$$

$$\begin{aligned} f(x) = & c_0 + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} + \dots \\ & + b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-p}^p f(x) dx &= \int_{-p}^p c_0 dx + \int_{-p}^p a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \int_{-p}^p a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} dx + \dots \\ &+ \int_{-p}^p b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \int_{-p}^p b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} dx + \dots \\ &= \int_{-p}^p c_0 dx + 0 + 0 + \dots \\ &= 2pc_0 \end{aligned}$$

$$c_0 = \frac{1}{2p} \int_{-p}^p f(x) dx$$



# Motivación

$$f(x) = c_0 + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} + \dots$$
$$+ b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} + \dots$$

$$f(x) \cos \frac{1\pi x}{p} = c_0 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + \dots$$
$$+ b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + \dots$$

# Motivación

$$f(x) = c_0 + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} + \dots \\ + b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} + \dots$$

$$f(x) \cos \frac{1\pi x}{p} = c_0 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + \dots \\ + b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + \dots$$

$$\int_{-p}^p f(x) \cos \frac{1\pi x}{p} dx = \int_{-p}^p c_0 \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \int_{-p}^p a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \\ + \int_{-p}^p a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \dots + \int_{-p}^p b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \\ + \int_{-p}^p b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \dots \\ = 0 + \int_{-p}^p a_1 \cos^2 \frac{1\pi x}{p} dx + 0 + 0 + \dots = pa_1$$

# Motivación

$$f(x) = c_0 + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} + \dots \\ + b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} + \dots$$

$$f(x) \cos \frac{1\pi x}{p} = c_0 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + \dots \\ + b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} + \dots$$

$$\int_{-p}^p f(x) \cos \frac{1\pi x}{p} dx = \int_{-p}^p c_0 \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \int_{-p}^p a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \\ + \int_{-p}^p a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \dots + \int_{-p}^p b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \\ + \int_{-p}^p b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} \cos \frac{1\pi x}{p} dx + \dots$$

$$= 0 + \int_{-p}^p a_1 \cos^2 \frac{1\pi x}{p} dx + 0 + 0 + \dots = pa_1 \rightarrow a_1 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{1\pi x}{p} dx$$

$$a_1 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{1\pi x}{p} dx$$

$$a_1 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{1\pi x}{p} dx$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots$$

$$a_1 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{1\pi x}{p} dx$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots$$

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx; \quad c_0 = \frac{1}{2p} \int_{-p}^p f(x) dx \rightarrow c_0 = \frac{a_0}{2}$$

# Coeficientes de Fourier

$$f(x) = c_0 + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} + \dots$$
$$+ b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} + \dots$$

$$f(x) \sin \frac{1\pi x}{p} = c_0 \sin \frac{1\pi x}{p} + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + \dots$$
$$+ b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + \dots$$

# Coeficientes de Fourier

$$f(x) = c_0 + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} + \dots \\ + b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} + \dots$$

$$f(x) \sin \frac{1\pi x}{p} = c_0 \sin \frac{1\pi x}{p} + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + \dots \\ + b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + \dots$$

$$\int_{-p}^p f(x) \sin \frac{1\pi x}{p} dx = \int_{-p}^p c_0 \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \int_{-p}^p a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \\ + \int_{-p}^p a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \dots + \int_{-p}^p b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \\ + \int_{-p}^p b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \dots \\ = 0 + \int_{-p}^p a_1 \sin^2 \frac{1\pi x}{p} dx + 0 + 0 + \dots = pa_1$$



# Coeficientes de Fourier

$$f(x) = c_0 + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} + \dots \\ + b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} + \dots$$

$$f(x) \sin \frac{1\pi x}{p} = c_0 \sin \frac{1\pi x}{p} + a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + \dots \\ + b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} + \dots$$

$$\int_{-p}^p f(x) \sin \frac{1\pi x}{p} dx = \int_{-p}^p c_0 \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \int_{-p}^p a_1 \cos \frac{1\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \\ + \int_{-p}^p a_2 \cos \frac{2\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \dots + \int_{-p}^p b_1 \sin \frac{1\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \\ + \int_{-p}^p b_2 \sin \frac{2\pi x}{p} \sin \frac{1\pi x}{p} dx + \dots$$

$$= 0 + \int_{-p}^p a_1 \sin^2 \frac{1\pi x}{p} dx + 0 + 0 + \dots = pa_1 \rightarrow a_1 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \sin \frac{1\pi x}{p} dx$$

$$b_1 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \operatorname{sen} \frac{1\pi x}{p} dx$$

$$b_1 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \operatorname{sen} \frac{1\pi x}{p} dx$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots$$

$$b_1 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \operatorname{sen} \frac{1\pi x}{p} dx$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots$$

# Serie de Fourier generada por $f$

Dada  $f$  definida en  $[-p, p]$ , definimos

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx;$$

# Serie de Fourier generada por $f$

Dada  $f$  definida en  $[-p, p]$ , definimos

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots ;$$

# Serie de Fourier generada por $f$

Dada  $f$  definida en  $[-p, p]$ , definimos

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots ;$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots$$

# Serie de Fourier generada por $f$

Dada  $f$  definida en  $[-p, p]$ , definimos

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots ;$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{p} + b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{p} \right).$$



# Serie de Fourier generada por $f$

Observación: lo mismo se hace en  $[0, 2p]$ : dada  $f$  definida en  $[0, 2p]$ , definimos

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_0^{2p} f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_0^{2p} f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots ;$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_0^{2p} f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{p} + b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{p} \right).$$

## 1 Series de Fourier

- Producto escalar y familias ortogonales de funciones
- Series trigonométricas de Fourier
- **Convergencia**
- Series de senos y cosenos de Fourier

## Teorema

*Sean  $f$  y  $f'$  continuas por partes (i.e., tienen un número finito de discontinuidades de salto) en  $[-p, p]$ . Entonces para toda  $x \in (-p, p)$  la serie de Fourier de  $f$  converge a*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2},$$

*donde  $f(x+)$  y  $f(x-)$  denotan los límites laterales de  $f$  en  $x$  por derecha e izquierda, respectivamente.*

## Teorema

*Sean  $f$  y  $f'$  continuas por partes (i.e., tienen un número finito de discontinuidades de salto) en  $[-p, p]$ . Entonces para toda  $x \in (-p, p)$  la serie de Fourier de  $f$  converge a*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2},$$

*donde  $f(x+)$  y  $f(x-)$  denotan los límites laterales de  $f$  en  $x$  por derecha e izquierda, respectivamente.*



Observación: si  $x$  es un punto de continuidad de  $f$ , la serie de Fourier converge a  $f(x)$  en es punto.

1

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } -\pi \leq x < 0; \\ -x + \pi, & \text{si } 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } -\pi \leq x < 0; \\ -x + \pi, & \text{si } 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

$$f(x) \sim \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi} \cos(nx) + \frac{1}{n} \sin(nx) \right)$$



Gráficos de sumas parciales.

2



$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } -\pi \leq x < 0; \\ x^2, & \text{si } 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

# Ejemplos

2

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } -\pi \leq x < 0; \\ x^2, & \text{si } 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

$$f(x) \sim \frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2(-1)^n}{n^2} \cos(nx) + \left( \frac{(-1)^{n+1}\pi}{n} + \frac{2}{\pi n^3}((-1)^n - 1) \right) \sin(nx) \right)$$



Gráficos de sumas parciales.



## 1 Series de Fourier

- Producto escalar y familias ortogonales de funciones
- Series trigonométricas de Fourier
- Convergencia
- Series de senos y cosenos de Fourier

# Funciones pares e impares

Sean  $f : [-p, p] \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : [-p, p] \rightarrow \mathbb{R}$ .

Si  $f$  es par,  $\int_{-p}^p f(x)dx = 2 \int_0^p f(x)dx$ .

Si  $f$  es impar,  $\int_{-p}^p f(x)dx = 0$ .

Si  $f$  y  $g$  son ambas pares o ambas impares,  $f \cdot g$  es par.

Si  $f$  es par y  $g$  es impar,  $f \cdot g$  es impar.

# Funciones periódicas

Una función  $f$  es periódica si  $f(x + P) = f(x)$  para todo  $x$ .  $P$  es una constante positiva. Cualquier número positivo  $P$  con esta propiedad se llama **periodo o período**. El menor de los periodos se llama **periodo fundamental**.

# Funciones periódicas

Una función  $f$  es periódica si  $f(x + P) = f(x)$  para todo  $x$ .  $P$  es una constante positiva. Cualquier número positivo  $P$  con esta propiedad se llama **periodo o período**. El menor de los periodos se llama **periodo fundamental**.

Ejemplos:

La función  $f(x) = \sin(x)$  tiene periodos  $2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$  y su periodo fundamental es  $2\pi$ .

La función  $g(x) = \sin(2x)$  tiene periodos  $\pi, 2\pi, 3\pi, \dots$  y su periodo fundamental es  $\pi$ .

Cada término de la serie



$$\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi} \cos(nx) + \frac{1}{n} \sin(nx) \right)$$

tiene periodo  $2\pi$ . Luego la serie tiene periodo  $2\pi$ .

# Ejemplo 1: revisado

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } -\pi \leq x < 0; \\ -x + \pi, & \text{si } 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

$$f(x) \sim \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi} \cos(nx) + \frac{1}{n} \sin(nx) \right)$$



Llamando  $F$  a la serie de Fourier generada por  $f$ :  
 $F$  está definida en  $\mathbb{R}$ .

$F(x) = f(x)$  para todo  $x \in (-\pi, 0)$  y todo  $x \in (0, \pi)$ , ya que  $f$  es continua en esos puntos.

$$F(0) = \pi/2 = \frac{f(0+) + f(0-)}{2} = F(-2\pi) = F(2\pi).$$

# Serie de Fourier generada por una función par

Sea  $f : [-p, p] \rightarrow \mathbb{R}$ . Buscamos los coeficientes de Fourier de  $f$ :

1) Si  $f$  es **par**,

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots ;$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \sin \frac{n\pi x}{p} dx = 0, n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{p} \right) \leftarrow \text{Serie de cosenos de Fourier de } f.$$

# Serie de Fourier generada por una función impar

Sea  $f : [-p, p] \rightarrow \mathbb{R}$ . Buscamos los coeficientes de Fourier de  $f$ :

2) Si  $f$  es **impar**,

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx = 0;$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx = 0, n = 1, 2, \dots;$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \sin \frac{n\pi x}{p} dx = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \sin \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{p} \leftarrow \text{Serie de senos de Fourier de } f.$$

# Extensiones par e impar de una función definida en un semiintervalo

Dada  $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ , se puede definir una nueva función, extensión de  $f$  al intervalo  $[-L, L]$ , que sea par o impar (esta última, si  $f(0) = 0$ ):

Extensión par:

$$g : [-L, L] \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } g(x) = \begin{cases} f(-x) & \text{si } -L \leq x < 0; \\ f(x) & \text{si } 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

Extensión impar (asumimos  $f(0) = 0$ ):

$$h : [-L, L] \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } h(x) = \begin{cases} -f(-x) & \text{si } -L \leq x < 0; \\ 0 & \text{si } x = 0; \\ f(x) & \text{si } 0 < x \leq L. \end{cases}$$



La **serie de cosenos de Fourier** de una función definida en un semiintervalo  $[0, L]$  es la serie de Fourier generada por la **extensión par de  $f$** .

# Serie de cosenos de Fourier

Para  $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ , la extensión par es:

$$g : [-L, L] \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } g(x) = \begin{cases} f(-x) & \text{si } -L \leq x < 0; \\ f(x) & \text{si } 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

Coeficientes para la serie de cosenos de Fourier de  $f$ :

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p g(x) dx = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p g(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots;$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p g(x) \sin \frac{n\pi x}{p} dx = 0, n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{p} \right) \leftarrow \text{Serie de cosenos de Fourier de } f.$$

La **serie de senos de Fourier** de una función definida en un semiintervalo  $[0, L]$  es la serie de Fourier generada por la **extensión impar de  $f$** .

# Serie de senos de Fourier

Para  $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ , la extensión impar es:

$$h : [-L, L] \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } h(x) = \begin{cases} -f(-x) & \text{si } -L \leq x < 0; \\ 0 & \text{si } x = 0; \\ f(x) & \text{si } 0 < x \leq L. \end{cases}$$

Coeficientes para la serie de senos de Fourier de  $f$ :

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p h(x) dx = 0;$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p h(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx = 0, n = 1, 2, \dots;$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p h(x) \sin \frac{n\pi x}{p} dx = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \sin \frac{n\pi x}{p} dx, n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{p} \leftarrow \text{Serie de senos de Fourier de } f.$$

# Serie de Fourier para una función definida en un semiintervalo

Si se desarrolla la función  $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$  en serie de Fourier, igualando  $[0, L] = [0, 2p]$  y  $L = 2p$ , se obtienen los coeficientes de Fourier


$$a_0 = \frac{1}{p} \int_0^{2p} f(x) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_0^{2p} f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{2n\pi x}{L} dx, n = 1, 2, \dots;$$


$$b_n = \frac{1}{p} \int_0^{2p} f(x) \sin \frac{n\pi x}{p} dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{2n\pi x}{L} dx, n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{2n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{2n\pi x}{L} \right).$$


# Ilustraciones de extensiones de funciones




$f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$



Extensión periódica





Extensión par




Extensión impar


# Ilustraciones de tipos de series



Serie del coseno



Serie de Fourier



Serie del seno

# Ejemplo

Sea  $f(x) = x + 1$  con  $0 \leq x < 1$ .

Los coeficientes de Fourier de  $f$  son  $a_0 = 3$ ,  $a_n = 0$  y  $b_n = -\frac{1}{n\pi}$ ,  
 $n = 1, 2, \dots$

Halle la serie de Fourier generada por  $f$ ,  $F$ , e indique cuánto valen  $F(0)$  y  $F(-1)$ .



# Ejemplo

Sea  $f(x) = x + 1$  con  $0 \leq x < 1$ .

Los coeficientes de Fourier de  $f$  son  $a_0 = 3$ ,  $a_n = 0$  y  $b_n = -\frac{1}{n\pi}$ ,  
 $n = 1, 2, \dots$

Halle la serie de Fourier generada por  $f$ ,  $F$ , e indique cuánto valen  $F(0)$  y  $F(-1)$ .

$$F(x) = \frac{3}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} \operatorname{sen}(2n\pi x).$$

$$F(0) = 1,5; \quad F(-1) = 1,5.$$

# Ejemplo

Sea  $f(x) = x + 1$  con  $0 \leq x < 1$ .

- 1 Plantee fórmulas para calcular los coeficientes de la serie de senos de Fourier de  $f$ ,  $F$ .

$$a_0 = 0, a_n = 0 \text{ y } b_n = 2 \int_0^1 (x + 1) \sin(2n\pi x) dx = -\frac{1}{n\pi}, n = 1, 2, \dots$$

- 2 Represente gráficamente la función  $F$  en  $[-3, 3]$ .
- 3 Indique cuánto valen  $F(-2)$  y  $F(\frac{3}{2})$ .