

# EJERCICIOS ANÁLISIS DE VARIABLE REAL

Juan Diego Barrado Daganzo

27 de octubre de 2022<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Este documento se actualiza, para consultar las últimas versiones entrar en el enlace <https://github.com/JuanDiegoBarrado/???>



## QUIÉNES SOMOS

Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente del Doble Grado de Informática y Matemáticas que queremos compartir unos apuntes de calidad y, como mínimo, ordenados para que os sea más fácil llevar la asignatura al día (sobre todo a estudiantes de Doble Grado).

Estos apuntes son posibles gracias a la colaboración de más alumnos como tú que deciden aportar un granito de arena al proyecto. Puedes contribuir de la siguiente manera:

- Notificando erratas
- Modificando erratas
- Proponiendo mejoras
- Aportando ejemplos nuevos
- Aportando nuevas versiones

Para contribuir no tienes más que ponerte en contacto con [juandbar@ucm.es](mailto:juandbar@ucm.es) o dejarnos un *Pull Request* en <https://github.com/JuanDiegoBarrado/CalculoDiferencial>. Los detalles para que la contribución de todos sea lo más homogénea posible estarán en el fichero *Contribute.md* de dicho repositorio o, en caso de no aparecer correctamente, podéis poneros en contacto con el correo anteriormente mencionado.

Muchas gracias, esperamos que este documento te sea útil.

## AGRADECIMIENTOS

Queremos dar gracias especialmente al Profesor Javier Soria, por ser el profesor que impartió la asignatura de *Cálculo Diferencial* durante la elaboración de estos apuntes y por darnos *feedback* sobre la calidad y las posibles mejoras de los mismos.

También queremos dar las gracias a los Profesores Víctor Manuel Sánchez, Jose María Martínez Ansemil y Socorro Ponte Miramontes, por elaborar otros manuales más formales sobre la asignatura que nos han permitido contrastar adecuadamente los nuestros y entender adecuadamente los contenidos aquí expuestos.

Cálculo Diferencial © 2021 by Juan Diego Barrado & Iker Muñoz is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International. To view a copy of this license, visit

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



# Índice general

---

1. Conjuntos y Funciones
--------------------------

3
---



# CONJUNTOS Y FUNCIONES

---

**Ejercicio 1** Sea  $A := \{n \in \mathbb{N} : n \leq 20\}$ ,  $B := \{3n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$  y  $C := \{2n + 1 : n \in \mathbb{N}\}$ , describir los conjuntos:

1.  $A \cap B \cap C$
2.  $(A \cap B) \setminus C$
3.  $(A \cap C) \setminus B$

**Solución Ejercicio 1** Cosas de prueba

1. En primer lugar, si  $m \in B \cap A$ , entonces nos preguntamos por los elementos de  $B$  que son menores o iguales que 20, es decir:

$$3n - 1 \leq 20 \Leftrightarrow \underbrace{n \leq \frac{21}{3} = 7}_{\text{Esto indica que } 1 \leq n \leq 7} \Rightarrow B \cap A = \underbrace{\{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20\}}_{\text{Por eso sólo hay 7}}$$

Del mismo modo, podemos expresar  $A \cap C$  como:

$$2n + 1 \leq 20 \Leftrightarrow n \leq \frac{19}{2} \xrightarrow{n \in \mathbb{N}} \underbrace{n \leq \frac{18}{2} = 9}_{\text{De nuevo, } 1 \leq n \leq 9} \Rightarrow C \cap A = \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

Luego,  $A \cap B \cap C = A \cap B \cap A \cap C$ , es decir, los comunes a los 2 conjuntos anteriores, por tanto:

$$A \cap B \cap C = \{5, 11, 17\}$$

2. Como ya tenemos calculada  $A \cap B$ , calcular  $(A \cap B) \setminus C$  no es más que quitar los elementos de  $C$ . Es más, como los elementos de  $A \cap B$  son menores que 20 (por definición) realmente tenemos que quitar los elementos de  $C$  menores que 20 (pues los otros seguro que no están para quitarlos) y, por tanto, tenemos que quitar los elementos de  $C \cap A$ , luego:

$$(A \cap B) \setminus C = \{2, 8, 14, 20\}$$

3. De nuevo, tenemos calculada  $A \cap C$  y hay que quitar los elementos de  $B$ , pero como los elementos de  $A \cap C$  son menores que 20 sólo hay que quitar los elementos de  $B$  menores que 20 (porque los demás no están) y, por tanto, hay que quitar  $B \cap A$ :

$$(A \cap C) \setminus B = \{3, 7, 9, 13, 15, 19\}$$

**Ejercicio 2** Mediante diagramas, identifica los siguientes conjuntos:

**Ejercicio 3** Sea  $I$  un conjunto de índices y para cada  $i \in I$  sea  $A_i$  un conjunto. Si  $B$  es otro conjunto demuestra que:

$$\left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$$

**Solución Ejercicio 2** En este tipo de ejercicios, para demostrar la igualdad de dos conjuntos se suele demostrar que uno está contenido en el otro y viceversa.

■  $\subset$

Para hacer el contenido de izquierda a derecha, suponemos que cogemos un elemento del de la izquierda y hay que ver que está en la derecha:

$$\begin{aligned} x \in \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B &\Rightarrow x \in \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) \wedge x \in B \Rightarrow (\exists i \in I : x \in A_i) \wedge x \in B \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists i \in I : (x \in A_i \wedge x \in B) \Rightarrow \exists i \in I : (x \in A_i \cap B) \Rightarrow \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B) \end{aligned}$$

■  $\supset$

Para ver el contenido de derecha a izquierda, volvemos a partir de un elemento de la derecha y tenemos que ver que está en la izquierda. En este caso, se puede coger la demostración anterior empezando por el final, puesto que a pesar de que se han puesto implicaciones, de hecho son equivalencias.

$$\begin{aligned} x \in \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B &\Leftrightarrow x \in \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) \wedge x \in B \Leftrightarrow (\exists i \in I : x \in A_i) \wedge x \in B \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists i \in I : (x \in A_i \wedge x \in B) \Leftrightarrow \exists i \in I : (x \in A_i \cap B) \Leftrightarrow \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B) \end{aligned}$$