

Álgebra Lineal

Matrices

Matrices

Definición

Sea \mathbb{K} un cuerpo. Una matriz A de m filas y n columnas sobre \mathbb{K} es un arreglo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Donde cada entrada $a_{ij} \in \mathbb{K}$ con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. En este caso, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Matrices

Definición

Sea \mathbb{K} un cuerpo. Una matriz A de m filas y n columnas sobre \mathbb{K} es un arreglo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Donde cada entrada $a_{ij} \in \mathbb{K}$ con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. En este caso, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

- La entrada a_{ij} = refiere al número que está en la fila i y columna j .

Matrices

Definición

Sea \mathbb{K} un cuerpo. Una matriz A de m filas y n columnas sobre \mathbb{K} es un arreglo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Donde cada entrada $a_{ij} \in \mathbb{K}$ con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. En este caso, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

- La entrada a_{ij} = refiere al número que está en la fila i y columna j .
- La matriz A es una matriz de tamaño $m \times n$.

Matrices

Definición

Sea \mathbb{K} un cuerpo. Una matriz A de m filas y n columnas sobre \mathbb{K} es un arreglo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Donde cada entrada $a_{ij} \in \mathbb{K}$ con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. En este caso, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

- La entrada a_{ij} = refiere al número que está en la fila i y columna j .
- La matriz A es una matriz de tamaño $m \times n$.
- $\mathbb{K}^{m \times n}$ es el conjunto de todas las matrices de tamaño $m \times n$.

Matrices

Definición

Sea \mathbb{K} un cuerpo. Una matriz A de m filas y n columnas sobre \mathbb{K} es un arreglo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Donde cada entrada $a_{ij} \in \mathbb{K}$ con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. En este caso, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

- La entrada a_{ij} = refiere al número que está en la fila i y columna j .
- La matriz A es una matriz de tamaño $m \times n$.
- $\mathbb{K}^{m \times n}$ es el conjunto de todas las matrices de tamaño $m \times n$.
- Otras formas de notar matrices:

Matrices

Definición

Sea \mathbb{K} un cuerpo. Una matriz A de m filas y n columnas sobre \mathbb{K} es un arreglo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Donde cada entrada $a_{ij} \in \mathbb{K}$ con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. En este caso, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

- La entrada a_{ij} = refiere al número que está en la fila i y columna j .
- La matriz A es una matriz de tamaño $m \times n$.
- $\mathbb{K}^{m \times n}$ es el conjunto de todas las matrices de tamaño $m \times n$.
- Otras formas de notar matrices:
 - $A = (a_{ij})$ con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$

Matrices

Definición

Sea \mathbb{K} un cuerpo. Una matriz A de m filas y n columnas sobre \mathbb{K} es un arreglo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Donde cada entrada $a_{ij} \in \mathbb{K}$ con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. En este caso, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

- La entrada a_{ij} = refiere al número que está en la fila i y columna j .
- La matriz A es una matriz de tamaño $m \times n$.
- $\mathbb{K}^{m \times n}$ es el conjunto de todas las matrices de tamaño $m \times n$.
- Otras formas de notar matrices:
 - $A = (a_{ij})$ con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$
 - $A = (a_{ij})_{m \times n}$

Ejemplo 1 La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene 3 filas y 3 columnas. Es decir que es una matriz de tamaño 3x3

Ejemplo 1 La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene 3 filas y 3 columnas. Es decir que es una matriz de tamaño 3x3
La entrada

$$a_{21} = 0$$

Ejemplo 1 La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene 3 filas y 3 columnas. Es decir que es una matriz de tamaño 3x3
La entrada

$$a_{21} = 0 \quad a_{32} = ?$$

Ejemplo 1 La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene 3 filas y 3 columnas. Es decir que es una matriz de tamaño 3x3
La entrada

$$a_{21} = 0 \quad a_{32} = ?$$

Ejemplo 2 La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene 2 filas y 3 columnas. Es decir que es una matriz de tamaño 2x3

Ejemplo 1 La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene 3 filas y 3 columnas. Es decir que es una matriz de tamaño 3x3

La entrada

$$a_{21} = 0 \quad a_{32} = ?$$

Ejemplo 2 La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene 2 filas y 3 columnas. Es decir que es una matriz de tamaño 2x3

La entrada

$$a_{13} = -1$$

Ejemplo 1 La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene 3 filas y 3 columnas. Es decir que es una matriz de tamaño 3x3
La entrada

$$a_{21} = 0 \quad a_{32} = ?$$

Ejemplo 2 La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene 2 filas y 3 columnas. Es decir que es una matriz de tamaño 2x3
La entrada

$$a_{13} = -1 \quad a_{22} = ?$$

Matrices

Dada una matriz A de m filas y n columnas, podemos indicarla como:

Matrices

Dada una matriz A de m filas y n columnas, podemos indicarla como:

$$A = [a_{ij}] \text{ donde } 1 \leq i \leq m \text{ y } 1 \leq j \leq n$$

Matrices

Dada una matriz A de m filas y n columnas, podemos indicarla como:

$$A = [a_{ij}] \text{ donde } 1 \leq i \leq m \text{ y } 1 \leq j \leq n$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \Leftrightarrow [C_1, \dots, C_n] \Leftrightarrow \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_m \end{pmatrix}$$

Matrices

Dada una matriz A de m filas y n columnas, podemos indicarla como:

$$A = [a_{ij}] \text{ donde } 1 \leq i \leq m \text{ y } 1 \leq j \leq n$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \Leftrightarrow [C_1, \dots, C_n] \Leftrightarrow \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_m \end{pmatrix}$$

- Si la vemos como un vector de columnas, cada columna es un vector de \mathbb{R}^m .

Matrices

Dada una matriz A de m filas y n columnas, podemos indicarla como:

$$A = [a_{ij}] \text{ donde } 1 \leq i \leq m \text{ y } 1 \leq j \leq n$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \Leftrightarrow [C_1, \dots, C_n] \Leftrightarrow \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_m \end{pmatrix}$$

- Si la vemos como un vector de columnas, cada columna es un vector de \mathbb{R}^m .
- Si la vemos como un vector de filas, cada fila es un vector de \mathbb{R}^n

Matrices

Definición

Una matriz se dirá cuadrada si tiene el mismo número de filas que de columnas. Es decir, si es de tamaño $n \times n$.

Matrices

Definición

Una matriz se dirá cuadrada si tiene el mismo número de filas que de columnas. Es decir, si es de tamaño $n \times n$.

Definición

Diremos que dos matrices A y B son iguales si:

Matrices

Definición

Una matriz se dirá cuadrada si tiene el mismo número de filas que de columnas. Es decir, si es de tamaño $n \times n$.

Definición

Diremos que dos matrices A y B son iguales si:

- (1) Tienen el mismo tamaño.*

Matrices

Definición

Una matriz se dirá cuadrada si tiene el mismo número de filas que de columnas. Es decir, si es de tamaño $n \times n$.

Definición

Diremos que dos matrices A y B son iguales si:

- (1) Tienen el mismo tamaño.*
- (2) Para cada i, j se cumple $a_{ij} = b_{ij}$.*

Matrices

Definición

Una matriz se dirá cuadrada si tiene el mismo número de filas que de columnas. Es decir, si es de tamaño $n \times n$.

Definición

Diremos que dos matrices A y B son iguales si:

- (1) Tienen el mismo tamaño.*
- (2) Para cada i, j se cumple $a_{ij} = b_{ij}$.*

Observación Un vector $(1, 0, -1)$ es una matriz de 1 fila y 3 columnas. Mientras que un vector

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ es una matriz de 3 filas y 1 columna

Operaciones entre matrices

Suma

Definición

Sean A y $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, entonces la suma de matrices $A + B$ es una nueva matriz $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ donde sus entradas están definidas por:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \text{ para cada } 1 \leq i \leq n \text{ y } 1 \leq j \leq m$$

Operaciones entre matrices

Suma

Definición

Sean A y $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, entonces la suma de matrices $A + B$ es una nueva matriz $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ donde sus entradas están definidas por:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \text{ para cada } 1 \leq i \leq n \text{ y } 1 \leq j \leq m$$

Ejemplo Determinar la suma de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Operaciones entre matrices

Suma

Definición

Sean A y $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, entonces la suma de matrices $A + B$ es una nueva matriz $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ donde sus entradas están definidas por:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \text{ para cada } 1 \leq i \leq n \text{ y } 1 \leq j \leq m$$

Ejemplo Determinar la suma de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Operaciones entre matrices

Suma

Definición

Sean A y $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, entonces la suma de matrices $A + B$ es una nueva matriz $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ donde sus entradas están definidas por:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \text{ para cada } 1 \leq i \leq n \text{ y } 1 \leq j \leq m$$

Ejemplo Determinar la suma de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

¿Siempre podremos realizar la suma entre matrices? ¿Por qué?

Operaciones entre matrices

Suma

Definición

Sean A y $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, entonces la suma de matrices $A + B$ es una nueva matriz $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ donde sus entradas están definidas por:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \text{ para cada } 1 \leq i \leq n \text{ y } 1 \leq j \leq m$$

Ejemplo Determinar la suma de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

¿Siempre podremos realizar la suma entre matrices? ¿Por qué? La suma entre matrices no siempre es posible. No se pueden sumar matrices de diferente tamaño.

Suma de matrices

Proposición

Dadas $A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$

(1) Es asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$

Suma de matrices

Proposición

Dadas $A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$

(1) Es asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$

(2) Es conmutativa: $A + B = B + A$

Suma de matrices

Proposición

Dadas $A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$

- (1) Es asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$*
- (2) Es conmutativa: $A + B = B + A$*
- (3) Tiene neutro: Existe $0 \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que $A + 0 = A$*

Suma de matrices

Proposición

Dadas $A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$

- (1) Es asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$*
- (2) Es conmutativa: $A + B = B + A$*
- (3) Tiene neutro: Existe $0 \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que $A + 0 = A$*
- (4) Tiene inverso: Para cada A existe $-A$ tal que $A + (-A) = 0$.*

Suma de matrices

Proposición

Dadas $A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$

- (1) Es asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$*
- (2) Es conmutativa: $A + B = B + A$*
- (3) Tiene neutro: Existe $0 \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que $A + 0 = A$*
- (4) Tiene inverso: Para cada A existe $-A$ tal que $A + (-A) = 0$.*

Suma de matrices

Proposición

Dadas $A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$

(1) Es asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$

(2) Es conmutativa: $A + B = B + A$

(3) Tiene neutro: Existe $0 \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que $A + 0 = A$

(4) Tiene inverso: Para cada A existe $-A$ tal que $A + (-A) = 0$.

Dada $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ su inverso para la suma es único y además si $A = [a_{ij}]$ entonces

$$-A = [-a_{ij}]$$

Suma de matrices

Proposición

Dadas $A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$

- (1) Es asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$
- (2) Es conmutativa: $A + B = B + A$
- (3) Tiene neutro: Existe $0 \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que $A + 0 = A$
- (4) Tiene inverso: Para cada A existe $-A$ tal que $A + (-A) = 0$.

Dada $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ su inverso para la suma es único y además si $A = [a_{ij}]$ entonces

$$-A = [-a_{ij}]$$

Ejemplo El inverso para la suma de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ es

$$-A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Operaciones entre matrices

Producto por un escalar

Definición

Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Entonces el producto del escalar por la matriz es otra matriz cuyos coeficientes son los productos λa_{ij} , donde $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$.

Ejemplo

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ -3 & -6 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Operaciones entre matrices

Producto

Definición

Dadas $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ se define el producto de matrices como una nueva matriz $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$$

Operaciones entre matrices

Producto

Definición

Dadas $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ se define el producto de matrices como una nueva matriz $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = F_i(A) \cdot C_j(B) \text{ para } 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$$

Operaciones entre matrices

Producto

Definición

Dadas $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ se define el producto de matrices como una nueva matriz $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = F_i(A) \cdot C_j(B) \text{ para } 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$$

Ejemplo Realicemos el producto

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Operaciones entre matrices

Producto

Definición

Dadas $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ se define el producto de matrices como una nueva matriz $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = F_i(A) \cdot C_j(B) \text{ para } 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$$

Ejemplo Realicemos el producto

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1 \cdot C_1 & F_1 \cdot C_2 \\ F_2 \cdot C_1 & F_2 \cdot C_2 \\ F_3 \cdot C_1 & F_3 \cdot C_2 \end{pmatrix}$$

Operaciones entre matrices

Producto

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1)$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1)$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2 = 1$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2 = 1$$

$$c_{31} = F_3 \cdot C_1 = 2 * 1 + (-1) * 1 + 1 * (-1)$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2 = 1$$

$$c_{31} = F_3 \cdot C_1 = 2 * 1 + (-1) * 1 + 1 * (-1) = 0$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2 = 1$$

$$c_{31} = F_3 \cdot C_1 = 2 * 1 + (-1) * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{32} = F_3 \cdot C_2 = 2 * (-1) + (-1) * 1 + 1 * 2$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2 = 1$$

$$c_{31} = F_3 \cdot C_1 = 2 * 1 + (-1) * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{32} = F_3 \cdot C_2 = 2 * (-1) + (-1) * 1 + 1 * 2 = -1$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2 = 1$$

$$c_{31} = F_3 \cdot C_1 = 2 * 1 + (-1) * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{32} = F_3 \cdot C_2 = 2 * (-1) + (-1) * 1 + 1 * 2 = -1$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2 = 1$$

$$c_{31} = F_3 \cdot C_1 = 2 * 1 + (-1) * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{32} = F_3 \cdot C_2 = 2 * (-1) + (-1) * 1 + 1 * 2 = -1$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2 = 1$$

$$c_{31} = F_3 \cdot C_1 = 2 * 1 + (-1) * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{32} = F_3 \cdot C_2 = 2 * (-1) + (-1) * 1 + 1 * 2 = -1$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

¿Podemos efectuar siempre el producto entre matrices?

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2 = 1$$

$$c_{31} = F_3 \cdot C_1 = 2 * 1 + (-1) * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{32} = F_3 \cdot C_2 = 2 * (-1) + (-1) * 1 + 1 * 2 = -1$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

¿Podemos efectuar siempre el producto entre matrices?

No, para poder realizar el producto de dos matrices $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ deben coincidir la cantidad de columnas del factor de la izquierda con la cantidad de filas del factor de la derecha.

Operaciones entre matrices

Producto

$$c_{11} = F_1 \cdot C_1 = 1 * 1 + 1 * (-1) + 2 * (-1) = -2$$

$$c_{12} = F_1 \cdot C_2 = 1 * (-1) + (-1) * 1 + 2 * 2 = 2$$

$$c_{21} = F_2 \cdot C_1 = 1 * 1 + 0 * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{22} = F_2 \cdot C_2 = 1 * (-1) + 0 * 1 + 1 * 2 = 1$$

$$c_{31} = F_3 \cdot C_1 = 2 * 1 + (-1) * 1 + 1 * (-1) = 0$$

$$c_{32} = F_3 \cdot C_2 = 2 * (-1) + (-1) * 1 + 1 * 2 = -1$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

¿Podemos efectuar siempre el producto entre matrices?

No, para poder realizar el producto de dos matrices $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ deben coincidir la cantidad de columnas del factor de la izquierda con la cantidad de filas del factor de la derecha. ¿Por qué?

Operaciones entre matrices

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ y un vector $v \in \mathbb{R}^m$ se puede obtener el producto

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}}_{n \times m} \underbrace{\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}}_{m \times 1} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1m}v_m \\ \vdots \\ a_{n1}v_1 + a_{n2}v_2 + \cdots + a_{nm}v_m \end{pmatrix}}_{n \times 1}$$

Operaciones entre matrices

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ y un vector $v \in \mathbb{R}^m$ se puede obtener el producto

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}}_{n \times m} \underbrace{\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}}_{m \times 1} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1m}v_m \\ \vdots \\ a_{n1}v_1 + a_{n2}v_2 + \cdots + a_{nm}v_m \end{pmatrix}}_{n \times 1}$$

Ejemplo Calcular

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Operaciones entre matrices

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ y un vector $v \in \mathbb{R}^m$ se puede obtener el producto

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}}_{n \times m} \underbrace{\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}}_{m \times 1} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1m}v_m \\ \vdots \\ a_{n1}v_1 + a_{n2}v_2 + \cdots + a_{nm}v_m \end{pmatrix}}_{n \times 1}$$

Ejemplo Calcular

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 * 1 + 0 * 2 + (-1) * 1 \\ 2 * 1 + 1 * 2 + 1 * 1 \\ 0 * 1 + (-1) * 2 + 1 * 1 \end{pmatrix}$$

Operaciones entre matrices

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ y un vector $v \in \mathbb{R}^m$ se puede obtener el producto

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}}_{n \times m} \underbrace{\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}}_{m \times 1} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1m}v_m \\ \vdots \\ a_{n1}v_1 + a_{n2}v_2 + \cdots + a_{nm}v_m \end{pmatrix}}_{n \times 1}$$

Ejemplo Calcular

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 * 1 + 0 * 2 + (-1) * 1 \\ 2 * 1 + 1 * 2 + 1 * 1 \\ 0 * 1 + (-1) * 2 + 1 * 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Operaciones con matrices

Producto de matrices cuadradas

Operaciones con matrices

Producto de matrices cuadradas

Proposición

Notemos que dadas A, B y C matrices de $\mathbb{R}^{n \times n}$, el producto tiene las siguientes propiedades:

(1) *Asociativo: $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$*

Operaciones con matrices

Producto de matrices cuadradas

Proposición

Notemos que dadas A, B y C matrices de $\mathbb{R}^{n \times n}$, el producto tiene las siguiente propiedades:

- (1) Asociativo: $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$*
- (2) Identidad: Existe I_n tal que $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$*

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz identidad de $n \times n$

Operaciones con matrices

Producto de matrices cuadradas

Proposición

Notemos que dadas A, B y C matrices de $\mathbb{R}^{n \times n}$, el producto tiene las siguiente propiedades:

(1) *Asociativo:* $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

(2) *Identidad:* Existe I_n tal que $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz identidad de $n \times n$

(3) *Distributivo:* $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$

Operaciones con matrices

Producto de matrices cuadradas

Proposición

Notemos que dadas A, B y C matrices de $\mathbb{R}^{n \times n}$, el producto tiene las siguiente propiedades:

(1) *Asociativo:* $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

(2) *Identidad:* Existe I_n tal que $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz identidad de $n \times n$

(3) *Distributivo:* $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$

NOTA: El producto de matrices no es conmutativo.

Para resolver...

Realizar las operaciones indicadas para las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(1) $A \cdot B$

(2) $B \cdot A$

(3) $(A + B) \cdot C$

Matriz traspuesta

Definición

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz con entradas $A = [a_{ij}]$, definimos su matriz traspuesta como

$$A^t = [a_{ji}]$$

Matriz traspuesta

Definición

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz con entradas $A = [a_{ij}]$, definimos su matriz traspuesta como

$$A^t = [a_{ji}]$$

A^t es de tamaño $n \times m$, que se obtiene de intercambiar las filas por las columnas.

Matriz traspuesta

Definición

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz con entradas $A = [a_{ij}]$, definimos su matriz traspuesta como

$$A^t = [a_{ji}]$$

A^t es de tamaño $n \times m$, que se obtiene de intercambiar las filas por las columnas.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz traspuesta

Definición

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz con entradas $A = [a_{ij}]$, definimos su matriz traspuesta como

$$A^t = [a_{ji}]$$

A^t es de tamaño $n \times m$, que se obtiene de intercambiar las filas por las columnas.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz traspuesta

Proposición

Para $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, se cumple:

- $(A^t)^t = A$

Matriz traspuesta

Proposición

Para $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, se cumple:

- $(A^t)^t = A$
- $(A + B)^t = A^t + B^t$

Matriz traspuesta

Proposición

Para $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, se cumple:

- $(A^t)^t = A$
- $(A + B)^t = A^t + B^t$
- $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$

Matriz traspuesta

Proposición

Para $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, se cumple:

- $(A^t)^t = A$
- $(A + B)^t = A^t + B^t$
- $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$
- $(\alpha \cdot A)^t = \alpha \cdot A^t$ con $\alpha \in \mathbb{R}$

Matriz simétrica - Matriz antisimétrica

Definición

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se dice:

- (1) Simétrica si $A = A^t$.*
- (2) Antisimétrica si $A = -A^t$.*

Matriz simétrica - Matriz antisimétrica

Definición

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se dice:

- (1) *Simétrica* si $A = A^t$.
- (2) *Antisimétrica* si $A = -A^t$.

Ejemplo La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Es simétrica

Matriz triangular

Definición

Una matriz A se dirá:

Matriz triangular

Definición

Una matriz A se dirá:

(1) *Triangular superior si $a_{ij} = 0$ para cada $i > j$.*

Matriz triangular

Definición

Una matriz A se dirá:

(1) *Triangular superior si $a_{ij} = 0$ para cada $i > j$. Es decir,*

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Matriz triangular

Definición

Una matriz A se dirá:

(1) *Triangular superior* si $a_{ij} = 0$ para cada $i > j$. Es decir,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

(2) *Triangular inferior* si $a_{ij} = 0$ para cada $i < j$.

Matriz triangular

Definición

Una matriz A se dirá:

(1) *Triangular superior* si $a_{ij} = 0$ para cada $i > j$. Es decir,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

(2) *Triangular inferior* si $a_{ij} = 0$ para cada $i < j$. Es decir,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Traza de una matriz

Definición

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz cuadrada, se define la traza de A , $tr(A)$ como la suma de todos los elementos de la diagonal principal de A . Es decir,

$$tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

Traza de una matriz

Definición

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz cuadrada, se define la traza de A , $tr(A)$ como la suma de todos los elementos de la diagonal principal de A . Es decir,

$$tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Traza de una matriz

Definición

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz cuadrada, se define la traza de A , $tr(A)$ como la suma de todos los elementos de la diagonal principal de A . Es decir,

$$tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$tr(A) = 1 + 1 + 4 = 6$$

Traza de una matriz

Proposición

Para A una matriz cuadrada, se cumple

- $tr(\alpha \cdot A) = \alpha \cdot tr(A)$ con $\alpha \in \mathbb{K}$

Traza de una matriz

Proposición

Para A una matriz cuadrada, se cumple

- $tr(\alpha \cdot A) = \alpha \cdot tr(A)$ con $\alpha \in \mathbb{K}$
- $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$

Traza de una matriz

Proposición

Para A una matriz cuadrada, se cumple

- $tr(\alpha \cdot A) = \alpha \cdot tr(A)$ con $\alpha \in \mathbb{K}$
- $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$
- $tr(AB) = tr(BA)$

Traza de una matriz

Proposición

Para A una matriz cuadrada, se cumple

- $tr(\alpha \cdot A) = \alpha \cdot tr(A)$ con $\alpha \in \mathbb{K}$
- $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$
- $tr(AB) = tr(BA)$
- $tr(A^t) = tr(A)$

Traza de una matriz

Proposición

Para A una matriz cuadrada, se cumple

- $tr(\alpha \cdot A) = \alpha \cdot tr(A)$ con $\alpha \in \mathbb{K}$
- $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$
- $tr(AB) = tr(BA)$
- $tr(A^t) = tr(A)$
- $tr(A^t A) \geq 0$