

1.3. Dado $R(a, b)$ un esquema de relación. Exprese en AR la consulta que devuelve las tuplas $t \in r(R)$ tal que $t[b] \leq t'[b] \forall t' \in r(R) / t'[a] = t[a]$ (o sea, los mínimos b por cada uno de los grupos de tuplas de la relación que cumplen que el valor para el atributo a es el mismo).

① $\rho(R_1, R)$

② $\rho(R_2, R)$

$\rho(\text{Coincide}_{\text{may}}, \pi_{a,b} \left(\begin{matrix} \textcircled{3} R_1 \times R_2 \\ \textcircled{4} R_1.a = R_2.a \wedge \\ R_1.b > R_2.b \end{matrix} \right)$

$\rho(\text{Result}, R - \text{Coincide}_{\text{may}})$
 $\hookrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

①

R_1	a	b
	1	2
	1	3
	1	1
	2	1
	2	5

②

R_1	a	b
	1	2
	1	3
	1	1
	2	1
	2	5

③

$R_1.a$	$R_1.b$ ④	$R_2.a$	$R_2.b$
1	2	1	1
1	3	1	2
1	3	1	1
2	5	2	1