

Nombre: _____ Legajo: _____

Haga cada ejercicio en una hoja diferente.
No se contestan preguntas.
Justifique sus cálculos.
Redondee los resultados finales a 4 decimales.
Ejercicio 1 de 5.

Leitmotiv: hijos (otra vez)

1. El tiempo entre cambios de pañales consecutivos de un bebé sigue una ley exponencial de media 4 horas. Asuma que los tiempos son independientes entre sí.
- (a) (1 pto.) ¿Cuál es la probabilidad de que pasen más de 24 horas hasta que se cambie el cuarto pañal?
- (b) (1 pto.) ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes típico de 30 días se usen más de 200 pañales?

Respuesta:

Sea $N(t)$ el proceso de Poisson asociado, esto es, el número de pañales cambiados hasta tiempo t . Para la primera pregunta tenemos $N(24) \sim \text{Poisson}(6)$ y

$$P(N(24) < 4) = \sum_{k=0}^3 \frac{6^k}{k!} e^{-6} = 0.1512.$$

Para la segunda pregunta, consideramos $N(720) \sim \text{Poisson}(180)$. La respuesta es:

$$P(N(720) > 200) = 1 - \sum_{k=0}^{200} \frac{180^k}{k!} e^{-180} = 0.0652.$$

Usando la aproximación normal sin corrección por continuidad:

$$P(N(720) > 200) \approx 1 - \Phi\left(\frac{200 - 180}{\sqrt{180}}\right) = 1 - \Phi(1.4907) = 0.0680.$$

Usando la aproximación normal con corrección por continuidad:

$$P(N(720) > 200) \approx 1 - \Phi\left(\frac{200.5 - 180}{\sqrt{180}}\right) = 1 - \Phi(1.5280) = 0.0633.$$

Página vacía.

Nombre: _____ Legajo: _____

Haga cada ejercicio en una hoja diferente.

No se contestan preguntas.

Justifique sus cálculos.

Redondee los resultados finales a 4 decimales.

Ejercicio 2 de 5.

2. Sobre una base de 981 respuestas a una encuesta entre familias con niños entre 0 y 3 años, se encontró que 362 de ellas han sufrido escasez de pañales.
- (a) (1 pto.) Suponiendo que la muestra es representativa, estime un intervalo de confianza del 95 % para la proporción de familias de EE.UU. con niños entre 0 y 3 años que han sufrido escasez de pañales.
- (b) (1 pto.) Suponga que usted descrea de los resultados. Si desea obtener el valor de la proporción un error menor al 1 % para un nivel de confianza del 99 %, ¿de qué tamaño debería tomar la muestra? *Ayuda: como descrea de los resultados, ignora qué valor $p \in (0,1)$ puede tomar la proporción.*

Respuesta:

Más allá de discusiones ecológicas respecto de los descartables, el surtido adecuado de pañales entre infantes de 0 a 3 años resulta necesario para su salud. Este aspecto en EE.UU. fue estudiado en el artículo

Sobowale, K., Clayton, A., & Smith, M. V. (2021). Diaper need is associated with pediatric care use: an analysis of a nationally representative sample of parents of young children. *The Journal of Pediatrics*, 230, 146-151.

Los datos se tomaron de este artículo.

Para el intervalo de confianza tenemos:

$$\hat{p} = \frac{362}{981} = 0.3690,$$
$$\Delta = z_{0.975} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 1.96 z_{0.975} \sqrt{\frac{0.3690(1-0.3690)}{981}} = 0.0302.$$

Por lo tanto, el intervalo es (0.3388, 0.3992).

Como se descrea de los resultados de la encuesta, no se conoce el valor de \hat{p} que se puede obtener. Por lo tanto, sólo sabemos que

$$\Delta = z_{0.995} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq z_{0.995} \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Pidiendo que esto sea menor a 0.01, tenemos

$$n \geq \left(\frac{z_{0.995}}{2 \times 0.01} \right)^2 = \left(\frac{2.5758}{2 \times 0.01} \right)^2 = 16587.2415.$$

Entonces, se necesita $n \geq 16588$.

Página vacía.

Nombre: _____ Legajo: _____

Haga cada ejercicio en una hoja diferente.

No se contestan preguntas.

Justifique sus cálculos.

Redondee los resultados finales a 4 decimales.

Ejercicio 3 de 5.

3. Se le encarga estimar la capacidad de absorción media del pañal “Cola Feliz”. Para ello deberá medir la absorción en una muestra de n pañales tomados al azar de la producción. Suponga que la absorción de un pañal tomado al azar puede considerarse una variable aleatoria con distribución normal de media y desvío desconocidos.
- (a) (1 pto.) Su jefe le pide que el error sea menor o igual a 10 ml con un nivel de confianza del 90 %. De acuerdo a expertos del área, el desvío muestral no puede ser superior a los 25 ml. ¿Cuál es el menor valor de n que puede usar? *Ayuda: haga una primera estimación asumiendo que el desvío poblacional es conocido y luego refínela por prueba y error.*
- (b) (1 pto.) Finalmente usa $n = 20$, obteniendo un valor promedio de 500 ml y un desvío muestral de 15 ml. Determine el intervalo de confianza al 90 %.

Respuesta:

Sabemos que

$$\Delta = t_{0.95, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Por lo tanto, necesitamos

$$n \geq \left(\frac{t_{0.95, n-1} s}{10} \right)^2 = (t_{0.95, n-1} 2.5)^2.$$

Obsérvese que tenemos n a la derecha de la desigualdad. Una aproximación al valor deseado se puede obtener reemplazando $t_{0.95, n-1}$ por $z_{0.95, n-1}$:

$$n \geq (z_{0.95} 2.5)^2 = 16.9096$$

Probemos, entonces, con $n = 17$. En este caso, tenemos:

$$\Delta = t_{0.95, 16} \frac{s}{\sqrt{17}} = 1.7459 \frac{25}{\sqrt{17}} = 10.5860 > 10.$$

Se requiere un valor más grande de n . Intentemos con $n = 18$:

$$\Delta = t_{0.95, 17} \frac{s}{\sqrt{18}} = 1.7396 \frac{25}{\sqrt{18}} = 10.2507 > 10.$$

Dado que este valor sigue siendo insuficiente, probamos con $n = 19$:

$$\Delta = t_{0.95, 18} \frac{s}{\sqrt{19}} = 1.7341 \frac{25}{\sqrt{19}} = 9.9455 < 10.$$

Finalmente, el mínimo valor de n es 19.

Si usamos los valores de la segunda pregunta:

$$\Delta = t_{0.95, 19} \frac{s}{\sqrt{20}} = 1.7291 \frac{15}{\sqrt{20}} = 5.7997.$$

Entonces el intervalo es (494.2003, 505.7997).

Página vacía.

Nombre: _____ Legajo: _____

Haga cada ejercicio en una hoja diferente.

No se contestan preguntas.

Justifique sus cálculos.

Redondee los resultados finales a 4 decimales.

Ejercicio 4 de 5.

4. El precio de los pañales Q depende de la demanda D de forma que $Q = 10D^2 + 2$. La investigadora Luz Imagina asegura que la demanda en un mes cualquiera puede modelarse como una variable aleatoria con distribución uniforme entre 0 y 1.
- (a) (1 pto.) Encuentre el valor esperado y la varianza de la Q .
- (b) (1 pto.) Encuentre la función de densidad de probabilidad de Q y grafíquela.

Respuesta:

$$\begin{aligned} E[Q] &= E[10D^2 + 2] = 10E[D^2] + 2. \\ E[Q^2] &= E[(10D^2 + 2)^2] = 100E[D^4] + 40E[D^2] + 4. \end{aligned}$$

Tenemos que hacer las integrales:

$$\begin{aligned} E[D^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_D(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}. \\ E[D^4] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 f_D(x) dx = \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} E[Q] &= \frac{16}{3} = 5.3333. \\ E[Q^2] &= \frac{3560}{15}. \\ \text{Var}[Q] &= E[Q^2] - [E[Q]]^2 = \frac{9400}{45} = 208.8889. \end{aligned}$$

Dado que $D \sim U(0, 1)$, la función de distribución acumulada de Q es $F_Q(q) = 0$ para $q < 2$ y $F_Q(q) = 1$ para $q > 12$. Para $q \in (2, 12)$ tenemos

$$F_Q(q) = P(10D^2 + 2 \leq q) = P\left(D \leq \sqrt{\frac{q-2}{10}}\right) = \sqrt{\frac{q-2}{10}}.$$

Derivando,

$$f_Q(q) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{10(q-2)}} & q \in (2, 12), \\ 0 & q \notin (2, 12). \end{cases}$$

Página vacía.

Nombre: _____ Legajo: _____

Haga cada ejercicio en una hoja diferente.

No se contestan preguntas.

Justifique sus cálculos.

Redondee los resultados finales a 4 decimales.

Ejercicio 5 de 5.

5. En un artículo científico se propusieron cadenas de Markov para modelar el sobrepeso infantil, el sobrepeso en la adultez y la muerte de individuos. El modelo para adultos tiene cuatro estados: peso normal (N), sobrepeso (S), obeso (O), muerto (M). Los estados se suceden en cada año de vida. El estudio encontró los siguientes valores:

- El 2 % de los adultos con peso normal pasa a tener sobre peso y nunca pasan directo a ser obesos. Supongamos que la probabilidad de morir es de 1.2 %.
 - El 1 % de los adultos con sobrepeso pasan a ser obesos y el 0.1 % baja al peso normal. La probabilidad de morir se incrementa al 1.3 %.
 - El 2 % de los adultos obesos baja a tener algo de sobrepeso y nunca pasa directo a un peso normal. En este caso, la probabilidad pasa a ser del 1.6 %.
- (a) (1 pto.) Dibuje el diagrama de la cadena de Markov y escriba la matriz de probabilidades de transición.
- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) ¿Existe una distribución estacionaria o a largo plazo? Justifique. *Ayuda: piense qué sucede siempre a la larga.*
- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Suponga que un adulto tiene peso normal. ¿Cuál es la esperanza de vida (tiempo medio antes de morir)?

Ayuda: de Wikipedia sacamos que, si \mathbb{Q} es una matriz de 3×3

$$\mathbb{Q}^{-1} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbb{Q})} \begin{bmatrix} A & D & G \\ B & E & H \\ C & F & I \end{bmatrix},$$

$$A = (ei - fh), \quad D = -(bi - ch), \quad G = (bf - ce),$$

$$B = -(di - fg), \quad E = (ai - cg), \quad H = -(af - cd),$$

$$C = (dh - eg), \quad F = -(ah - bg), \quad I = (ae - bd),$$

$$\det(\mathbb{Q}) = aA + bB + cC.$$

Respuesta:

El estudio en cuestión fue

Sonntag, D., Ali, S., Lehnert, T., Konnopka, A., Riedel-Heller, S., & König, H. H. (2015). Estimating the lifetime cost of childhood obesity in Germany: results of a Markov model. *Pediatric Obesity*, 10(6), 416-422.

Los valores consignados son aproximados, ya que, en realidad, dependen de la franja etaria.

Colocando los estados en el orden M, N, S, O :

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 1.000 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.012 & 0.958 & 0.020 & 0.000 \\ 0.013 & 0.010 & 0.967 & 0.010 \\ 0.016 & 0.000 & 0.020 & 0.964 \end{pmatrix}.$$

Existe una distribución a largo plazo ya que existe **un solo estado absorbente que es alcanzable desde todos los demás estados**: $\vec{\pi} = (1, 0, 0, 0)$.

Haciendo $\mathbb{Q} = \mathbb{P}(2 : 4, 2 : 4)$, tenemos los valores esperados en

$$(\mathbb{I} - \mathbb{Q})^{-1} = \begin{pmatrix} 40.4653 & 29.4889 & 8.1913 \\ 14.7444 & 47.1822 & 13.1062 \\ 8.1913 & 26.2123 & 35.0590 \end{pmatrix}.$$

Sumando la primera fila, tenemos la respuesta que queremos: 63.4010.