

Proyecto 1

Aplicaciones de EDO

Juan José Rivera Román - 20002802
 Mario Esteban Ponce Contreras - 21000508
 Universidad Galileo
 Guatemala, Guatemala

Resumen—Al momento de trabajar con ecuaciones diferenciales de primer orden, no siempre es posible expresar la solución de manera explícita o implícita, aun cuando sea posible demostrar que dicha solución existe. En esos casos, una forma de expresar la solución a una ecuación diferencial es por medio de algún método numérico. En este proyecto se estudia y aplica el método de Runge-Kutta, uno de los métodos numéricos más precisos.

I. INTRODUCCIÓN

En este proyecto se pone en práctica lo aprendido en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, los distintos tipos de métodos para encontrar las soluciones generales y particulares, además, se explorará el método de aproximación de Runge-Kutta que permite aproximar la solución a una ecuación diferencial de primer orden con valores iniciales $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$.

El objetivo principal del proyecto es entender y aplicar el método de aproximación de Runge-Kutta, comparar los resultados con el método analítico estudiado en clase y comprobar la precisión del método para la resolución de ecuaciones diferenciales dados ciertos valores iniciales.

II. PROCEDIMIENTO

Se inició la práctica investigando en distintas fuentes el método de Runge-Kutta, cómo utilizarlo y las condiciones que deben cumplir para aplicar el método. Luego se procedió a abstraer el método en código de programación para facilitar la realización pruebas que permitan validar el correcto funcionamiento del algoritmo aplicado. Finalmente, se diseñó e implementó una interfaz de usuario para que cualquier usuario pueda hacer uso del algoritmo sin conocimiento previo en programación.

II-A. Materiales

- Computadora con Visual Studio Code y procesador de 1.80GHz mínimo.
- Software: Nodejs, npm y Vue-cli.

II-B. Diagrama de flujo del proyecto




Figura 1. Diagrama de flujo del proyecto

II-C. Pasos del procedimiento

Siguiendo el algoritmo de aproximación del método de Runge-Kutta:

1. Se definen la ecuación $y' = f(x, y)$ y sus valores iniciales x_0 y $y(x_0)$ además de definir el tamaño del paso h entre x_n y x_{n-1}
2. Dependiendo del orden del método a utilizar, se calcula determinado número de términos que forman parte del promedio ponderado con el que se forma el polinomio de Taylor que se utiliza para aproximar la solución.

Para el método de primer orden:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (1)$$

Para el método de segundo orden:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \quad (2)$$

Donde:

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$$

Para el método de cuarto orden:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (3)$$

Donde:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_n, y_n) \\ k_2 &= f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hk_1\right) \\ k_3 &= f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hk_2\right) \\ k_4 &= f(x_n + h, y_n + hk_3) \end{aligned}$$

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos por medio del método analítico con los resultados obtenidos por medio del método de Runge-Kutta de diferente orden. En general, la aproximación es mucho mejor al aumentar el grado del método, y gráficamente, es mucho más fácil apreciar la precisión de la aproximación en cuanto menor sea el paso h entre cada iteración.

III. RESULTADOS

III-A. Prueba 1

Cuadro I
DATOS PARA LA PRUEBA 1

EDO	$y' = x + 1 - y$
Método	RK2
h	0.25
$y(0)$	0
x	1
Solución	$y(x) = x$

Cuadro II
RESULTADOS DE LA PRUEBA 1

x_n	k_1	k_2	y_n	Valor real	% de error
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00 %
0.25	1.0000	1.0000	0.2500	0.2500	0.00 %
0.50	1.0000	1.0000	0.5000	0.5000	0.00 %
0.75	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	0.00 %
1.00	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.00 %




Figura 2. Comparación gráfica de la solución analítica y la aproximación RK2

III-B. Prueba 2

Cuadro III
DATOS PARA LA PRUEBA 2

EDO	$y' = 2y - 6$
Método	RK4
h	0.25
$y(0)$	1
x	1
Solución	$y(x) = 3 - 2e^{2x}$

Cuadro IV
RESULTADOS DE LA PRUEBA 2

x_n	k_1	k_2	k_3	k_4
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.25	1.0000	1.0000	0.2500	0.2500
0.50	1.0000	1.0000	0.5000	0.5000
0.75	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500
1.00	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

x_n	y_n	Valor real	% de error
0.00	0.0000	0.0000	0.00 %
0.25	0.0000	0.0000	0.00 %
0.50	0.0000	0.0000	0.00 %
0.75	0.0000	0.0000	0.00 %
1.00	0.0000	0.0000	0.00 %




Figura 3. Comparación gráfica de la solución analítica y la aproximación RK4

III-C. Prueba 3

Si la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea, entonces la velocidad v de una masa m que se deja caer desde cierta altura, con:

$$m = 5 \text{ slugs}$$

$$k = 0,125$$

$$g = 32 \frac{\text{pies}}{\text{s}^2}$$

Se puede modelar como:

$$v' - \frac{k}{m}v^2 = g \quad (4)$$

IV. DISCUSIÓN / ANÁLISIS

Tanto en la Prueba 1 como en la Prueba 2, los valores aproximados por el método de Runge-Kutta se acercaron significativamente a los valores calculados de manera analítica, esto se hace aún más evidente al observar las gráficas, tanto la gráfica de la solución exacta como la gráfica de la aproximación por el método de Runge-Kutta se superponen, dejando en claro que sus valores son casi idénticos.

En el caso de la prueba 2, a pesar de que el porcentaje de error fue mayor, este es aun menor al 0.2 %, lo que lo hace una aproximación lo suficientemente exacta para la mayoría de aplicaciones.

V. CONCLUSIÓN

Es importante ser capaces de identificar y resolver ecuaciones diferenciales, puesto que su aplicación en el mundo real es amplia. Sin embargo, que una ecuación diferencial tenga una o varias soluciones, no significa necesariamente que esta pueda ser expresada de forma explícita o implícita, para estos casos en donde la solución no puede expresarse de manera simple el método de aproximación de Runge-Kutta resulta muy útil. Aun si se aplica el método de primer orden, las aproximaciones son más exactas que con otros métodos numéricos y su implementación es relativamente sencilla, especialmente si se utiliza el recurso computacional para facilitar y acelerar el calculo de todos los datos del rango que se desea.

REFERENCIAS

- [1] Trench, William, *Elementary Differential Equations*, <https://digitalcommons.trinity.edu/mono/8>, Trinity University, 2013.
- [2] Zill, D., *Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado*. Cengage Learning, 11a. edición, 2018.