

Eléments de théorie des groupes  
Résolutions des exercices

Enoncés de Josette Calais.  
Résolutions de Oestromemes abonnez vous

---

# Table des matières

---

1	Structure de groupe	2
2	Classes modulo un sous-groupe	13

# STRUCTURE DE GROUPE

1) Soit  $\mathbb{Z}$  l'ensemble des entiers rationnels, muni de la loi de composition interne notée  $*$ , définie par :

$$\begin{aligned} * : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ (a, b) &\mapsto a - b. \end{aligned}$$

- a) La loi  $*$  est-elle associative ? commutative ?  
 b) Vérifier qu'il existe dans  $(\mathbb{Z}, *)$  un élément neutre à droite, c'est-à-dire un élément  $e$  tel que

$$\forall a \in \mathbb{Z}, a * e = a.$$

$e$  est-il neutre dans  $(\mathbb{Z}, *)$  ?

- c) Existe-t-il, pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ , un symétrique à droite relativement à  $e$ , c'est-à-dire un élément  $a'$  tel que  $a * a' = e$

- 
- a)  $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, (a * b) * c = a - b - c$ , et  $a * (b * c) = a - b + c$ , la loi n'est pas associative. Et  $2 * 1 = 1 \neq -1 = 1 * 2$  montre qu'elle n'est pas non plus commutative.  
 b) On vérifie que 0 est un neutre à droite pour  $*$  :  $\forall a \in \mathbb{Z}, a * 0 = a - 0 = a$ . Il n'est cependant pas un neutre pour  $*$ , car  $0 * a = -a \neq a$ .  
 c)  $\forall a \in \mathbb{Z}, a * a' = e \Rightarrow a = a'$ . Pour tout élément  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $a$  est son propre inverse à droite.

2) Soit  $\mathbb{Q}$  l'ensemble des nombres rationnels muni de la loi de composition interne notée  $*$  définie par :

$$\begin{aligned} * : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} &\rightarrow \mathbb{Q} \\ (a, b) &\mapsto a + b + ab. \end{aligned}$$

$(\mathbb{Q}, *)$  est-il un groupe ?

---

La loi  $*$  admet 0 comme élément neutre, en effet,  $a * 0 = 0 * a = a$ . Cependant,  $-1$  n'est pas symétrisable par cette loi, car on a  $a * -1 = a - 1 - a = -1$ , donc  $(\mathbb{Q}, *)$  n'est pas un groupe.

---

3) Soit  $G$  un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne *associative* notée  $\cdot$  : on suppose que dans  $(G, \cdot)$  les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- 1° il existe un élément *neutre à droite*  $e$  (voir exercice 1) ;  
 2° tout élément  $x \in G$  admet un *symétrique à droite*,  $x'$  (voir exercice 1).

Démontrer que  $(G, \cdot)$  est un groupe ; vérifier, par un contre exemple, que, sans l'associativité de la loi  $\cdot$ , ce résultat n'est plus vrai.

---

Montrons que le symétrique à droite de tout élément  $a$  de  $G$  est aussi son symétrique à gauche.

$$\begin{aligned} aa' = e &\Rightarrow a'(aa') = a', \\ &\Rightarrow (a'a)a' = a'. \end{aligned}$$

En multipliant des deux cotés par le symétrique à droite de  $a'$ , on obtient :

$$a'a = e.$$

Ainsi, le symétrique à droite de  $a$  est aussi son symétrique à gauche.

Montrons que le neutre à droite de  $G$  est aussi un neutre à gauche, et donc un neutre tout court.

$$\begin{aligned} \forall a \in G, \quad ea &= (aa')a, \\ &= a(a'a), \\ &= a. \end{aligned}$$

Ainsi, le neutre à droite de  $G$  est aussi un neutre à gauche.

$(G, \cdot)$  est donc un groupe.

On vérifie que pour  $(\mathbb{Z}, -)$ , la loi n'est pas associative, mais que 0 est un neutre à droite (et non à gauche) et que tout élément est symétrisable.

4) Soit  $G$  un ensemble *fini*, non vide, muni d'une loi de composition interne notée  $\cdot$ ; on suppose que la loi  $\cdot$  est associative et que dans  $(G, \cdot)$  tout élément est simplifiable à droite et à gauche.

Démontrer que  $(G, \cdot)$  est un groupe.

Tout les éléments étant simplifiables à droite implique que les applications :

$$\begin{aligned} \tau_g^y : G &\rightarrow G, & \tau_d^y : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto yx, & x &\mapsto xy, \end{aligned}$$

Sont injectives. Le cardinal de  $G$  étant fini, ces translations sont bijectives.

Ainsi, pour  $a$  et  $b$  fixé, les équations  $a = xb$  et  $a = bx$  ont chacune une unique solution.

En particulier, pour chaque élément  $a$  de  $G$ , il existe des uniques  $e_d^a$  et  $e_g^a$  tel que  $a = e_d^a a$  et  $a = a e_g^a$ .

Vérifions qu'ils sont égaux :

$$\begin{aligned} \forall a \in G, \quad aa &= aa, \\ a(e_g^a a) &= (a e_d^a) a, \\ a e_g^a a &= a e_d^a a, \\ a e_g^a &= a e_d^a \text{ (Simplification à droite),} \\ e_g^a &= e_d^a \text{ (Simplification à gauche).} \end{aligned}$$

Vérifions maintenant que tout les éléments ont le même neutre :

$$\begin{aligned} \forall a, b \in G, \quad ab &= ab, \\ (a e^a) b &= a (e^b b), \\ a e^a b &= a e^b b, \\ a e^a &= a e^b \text{ (Simplification à droite),} \\ e^a &= e^b \text{ (Simplification à gauche).} \end{aligned}$$

Ainsi, dans  $G$ , il existe un unique élément neutre  $e$ .

Reste à montrer que chaque élément  $a$  admet un unique inverse  $a^{-1}$ .

On sait que les équations  $e = ax$  et  $e = xa$  ont une unique solution chacune, notées respectivement  $a_g^*$  et  $a_d^*$ . Vérifions qu'il est le même des deux cotés, et est donc l'inverse de  $a$ .

$$\begin{aligned} \forall a \in G, \quad a &= a, \\ a(a_g^* a) &= (a a_d^*) a, \\ a a_g^* a &= a a_d^* a, \\ a_g^* &= a_d^* \text{ en simplifiant à droite et à gauche.} \end{aligned}$$

Chaque élément possède un unique inverse, et  $G$  possède un élément neutre pour la loi associative  $\cdot$ . Ainsi,  $(G, \cdot)$  est un groupe.

5) Soit  $G$  un groupe d'élément unité  $e$  vérifiant la condition (C) :

$$\forall x \in G, x^2 = e.$$

- a) Donner au moins un exemple de groupe, non réduit à l'élément unité, vérifiant la condition (C).
- b) Démontrer que tout groupe vérifiant la condition (C) est abélien.

a) Le groupe  $\left(\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, +\right)$  vérifie de façon évidente la condition.

b) la condition (C) implique que chaque élément est son propre inverse, ainsi :

$$\begin{aligned}\forall a, b \in G, \quad (ab)^2 &= e, \\ abab &= e, \\ bab &= a, \\ ab &= ba.\end{aligned}$$

Tout groupe vérifiant la propriété est donc abélien.

6)  $G$  étant un groupe, prouver que l'application  $f : G \rightarrow G$  est une permutation de  $G$  et que  $f$  est un automorphisme si et seulement si  $G$  est abélien.

Chaque élément d'un groupe possède un unique inverse, l'application est donc trivialement bijective.

Supposons que  $G$  soit abélien :

$$\begin{aligned}\forall a, b \in G, \quad f(ab) &= (ab)^{-1}, \\ &= b^{-1}a^{-1}, \\ &= a^{-1}b^{-1}, \\ &= f(a)f(b).\end{aligned}$$

Donc abélien  $\Rightarrow$  automorphisme.

Supposons que  $f$  soit un automorphisme :

$$\begin{aligned}\forall a, b \in G, \quad f(ab) &= f(a)f(b), \\ b^{-1}a^{-1} &= a^{-1}b^{-1}, \\ ab &= ba.\end{aligned}$$

ainsi,  $f$  est un automorphisme si et seulement si  $G$  est abélien.

7) Montrer que si  $G$  est un groupe fini d'ordre pair, il existe au moins un élément  $x \neq e$ , dans  $G$ , tel que  $x^2 = e$ .

Soit  $G$  d'ordre  $2n$ , définissons la relation d'équivalence :

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x = y \text{ ou } x = y^{-1}.$$

Soit  $\{x_i\}_{i \in I}$  une famille de représentants des classes modulo  $\mathcal{R}$ . On a  $1 \leq \overline{x_1} \leq 2$ . le groupe se partitionne en  $k$  classes d'un élément et  $l$  classes de deux éléments, et on a donc :

$$2n = k + 2l$$

Pour respecter la parité, il faut donc que  $k$  soit pair, et sachant que  $k > 1$ , qu'il existe au moins un élément différent du neutre tel que  $x^2 = e$ .

8) Dans l'ensemble des entiers  $\mathbb{Z}$ , on pose  $U = \{-1, 1\}$ .

- a) Vérifier que  $U$  est un groupe relativement à la multiplication des entiers, donc un sous-groupe de  $(\mathbb{Q}^*, \times)$ .  
 b) Montrer que le groupe  $U$  est isomorphe au groupe  $\left(\frac{\mathbb{Z}}{(2)}, +\right)$ .

- a) On a  $U \subset \mathbb{Z}$ . On vérifie aussi que,  $\forall x, y \in U$ ,  $xy \in U$  et  $x^{-1} \in U$ , c'est donc un sous-groupe de  $(\mathbb{Q}^*, \times)$ .  
 b) On pose l'application :

$$\begin{aligned} \varphi : \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} &\rightarrow U \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = \bar{0} \\ -1 & \text{si } x = \bar{1} \end{cases} \end{aligned}$$

On vérifie de façon exhaustive que c'est un morphisme :

$$\begin{aligned} \varphi(\overline{0+0}) &= 1 = 1 \times 1 = \varphi(\bar{0})\varphi(\bar{0}) \\ \varphi(\overline{0+1}) &= -1 = 1 \times -1 = \varphi(\bar{0})\varphi(\bar{1}) \\ \varphi(\overline{1+0}) &= -1 = -1 \times 1 = \varphi(\bar{1})\varphi(\bar{0}) \\ \varphi(\overline{1+1}) &= 1 = -1 \times -1 = \varphi(\bar{1})\varphi(\bar{1}) \end{aligned}$$

Elle est aussi bijective par définition, ainsi,  $U$  est isomorphe à  $\left(\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, +\right)$

9) Soit  $\mathbf{D}$  le sous ensemble de  $\mathbb{Q}$  formé par les nombres décimaux :

$$\mathbf{D} = \left\{ \frac{a}{10^n}; a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Prouvez que  $\mathbf{D}$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{Q}, +)$ .

De façon évidente,  $\mathbf{D} \subset \mathbb{Q}$ . Soit  $\frac{a}{10^n}, \frac{b}{10^m}$ ,

$$\frac{a}{10^n} - \frac{b}{10^m} = \frac{10^m a - 10^n b}{10^{n+m}}.$$

On a  $10^m a - 10^n b \in \mathbb{Z}$ , et  $n + m \in \mathbb{N}$ , donc  $\frac{a}{10^n} - \frac{b}{10^m} \in \mathbf{D}$ , ainsi  $(\mathbf{D}, +)$  est un sous groupe de  $(\mathbb{Q}, +)$

10) Soit, dans  $\mathbb{N}$ , un nombre premier  $p$ . On pose :

$$\mathbb{Q}_p = \left\{ \frac{a}{p^n}; a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- a) Vérifier que  $\mathbb{Q}_p$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{Q}, +)$  et que  $\mathbb{Q}_p = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \langle \frac{1}{p^n} \rangle$ .  
 b) Montrer que l'application  $\begin{array}{ccc} \varphi : \mathbb{Q}_p & \rightarrow & \mathbb{Q}_p \\ x & \mapsto & px. \end{array}$  est une permutation de  $\mathbb{Q}_p$ . L'application  $\varphi$  est-elle un automorphisme de  $(\mathbb{Q}_p, +)$  ?

a)  $\mathbb{Q}_p \in \mathbb{Q}$ , et soit  $\frac{a}{p^n}, \frac{b}{p^m} \in \mathbb{Q}_p$  :

$$\frac{a}{p^n} - \frac{b}{p^m} = \frac{p^m a - p^n b}{p^{n+m}}.$$

On a  $p^m a - p^n b \in \mathbb{Z}$ , et  $n + m \in \mathbb{N}$ , donc  $\frac{a}{p^n} - \frac{b}{p^m} \in \mathbb{Q}_p$ , ainsi  $(\mathbb{Q}_p, +)$  est un sous groupe de  $(\mathbb{Q}, +)$ . De plus :

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \langle \frac{1}{p^n} \rangle = \left\{ \frac{a}{p^n}; a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\} = \mathbb{Q}_p.$$

b)  $\varphi$  est clairement injective. De plus, comme  $\frac{a}{p^n} = p \frac{a}{p^{n+1}}$ , on en déduit que  $\phi$  est surjective, donc que c'est une permutation.

$$\begin{aligned} \forall x, y \in \mathbb{Q}_p, \quad \varphi(x + y) &= p(x + y), \\ &= px + py, \\ &= \varphi(x) + \varphi(y). \end{aligned}$$

ce qui prouve que  $\varphi$  est un morphisme, et donc un automorphisme.

**11)** Soit  $p$  un nombre premier dans  $\mathbb{N}$ . Vérifier les propriétés suivantes :

- $\{a + b\sqrt{p}; (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\} < (\mathbb{R}, +)$
- $\{a + b\sqrt{p}; a \text{ et } b \text{ dans } \mathbb{Q} \text{ et non simultanément nuls}\} < (\mathbb{R}^*, \times)$
- $\{a + ib\sqrt{p}; (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\} < (\mathbb{C}, +)$
- $\{a + ib\sqrt{p}; a \text{ et } b \text{ dans } \mathbb{Q} \text{ et non simultanément nuls}\} < (\mathbb{C}^*, \times)$

On note que si  $p$  n'est pas un carré parfait,  $\sqrt{p}$  est irrationnel, chaque élément du groupe s'écrit de façon unique et tout se passe nickel.

Posons  $G = \{a + b\sqrt{p}; (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\}$

De façon évidente,  $G \subset \mathbb{R}$ . Soit  $a + b\sqrt{p}, a' + b'\sqrt{p} \in G$  :

$$a + b\sqrt{p} - (a' + b'\sqrt{p}) = (a - a') + (b - b')\sqrt{p} \in G$$

Et idem pour les 3 autres flemmes.

**12)** On pose :

$$\Gamma_\infty = \{z \in \mathbb{C}; \exists n \in \mathbb{N}, z^n = 1\}.$$

Vérifier que  $\Gamma_\infty$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{C}^*, \times)$ .

$\Gamma_\infty \subset \mathbb{C}$ , soit  $z_1, z_2 \in \Gamma_\infty$ , il existe  $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $z_1^{n_1} = z_2^{n_2} = 1$ .

On constate que  $(z_1 z_2^{-1})^{n_1 n_2} = (z_1^{n_1})^{n_2} (z_2^{n_2})^{-n_1} = 1$ , et donc  $z_1 (z_2)^{-1} \in \Gamma_\infty$ , donc  $\Gamma_\infty$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{C}^*, \times)$ .

**13)** A tout nombre réel  $a$  on associe l'application

$$\begin{aligned} \tau_a : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto a + x. \end{aligned}$$

Justifier la propriété :

$T = \{\tau_a; a \in \mathbb{R}\}$  est un sous-groupe du groupe symétrique  $S_{\mathbb{R}}$  et le groupe  $T$  est isomorphe au groupe  $(\mathbb{R}, +)$ .

Lemme (1.77)

**14)** On considère les groupes multiplicatifs  $\mathbb{R}^*$ ,  $\mathbb{R}_+^*$  et  $\mathbb{C}^*$  (voir exemple (1.29)) et les applications :

$$f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*, \text{ où } |x| \text{ est la valeur absolue de } x.$$

$$x \mapsto |x|.$$

$$\text{et } g : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*, \text{ où } |z| \text{ est le module de } z.$$

$$z \mapsto |z|.$$

Vérifier que  $f$  et  $g$  sont des épimorphismes de groupes.

Déterminer les noyaux de  $f$  et  $g$ .

Soit  $x$  un élément de  $\mathbb{R}_+^*$ , on a  $f(x) = x$ , donc  $f$  est surjective, vérifions que c'est un morphisme :

$$\begin{aligned} \forall x, y \in \mathbb{R}, f(xy) &= |xy|, \\ &= |x||y|, \\ &= f(x)f(y). \end{aligned}$$

C'est donc un épimorphisme de groupe, déterminons son noyau :

$$\begin{aligned} \text{Ker } f &= \{x \in \mathbb{R}^*, f(x) = 1\}, \\ &= \{x \in \mathbb{R}^*, |x| = 1\}, \\ &= \{-1, 1\}. \end{aligned}$$

Soit  $x$  un élément de  $\mathbb{R}_+^*$ , on a  $g(x) = x$ , donc  $g$  est surjective, vérifions que c'est un morphisme :

$$\begin{aligned} \forall x, y \in \mathbb{R}, g(xy) &= |xy|, \\ &= |x||y|, \\ &= g(x)g(y). \end{aligned}$$

C'est donc un épimorphisme de groupe, déterminons son noyau :

$$\begin{aligned} \text{Ker } g &= \{x \in \mathbb{R}^*, f(x) = 1\}, \\ &= \{x \in \mathbb{R}^*, |x| = 1\}, \\ &= \mathbb{U}. \end{aligned}$$

**15)** Démontrer que l'application  $\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$  est un isomorphisme du groupe  $(\mathbb{R}, +)$  sur le groupe  $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ .

Vérifions que c'est une morphisme :

$$\begin{aligned} \forall a, b \in \mathbb{R}, \lambda(a+b) &= 10^{a+b}, \\ &= 10^a 10^b, \\ &= \lambda(a)\lambda(b). \end{aligned}$$

L'injectivité :

$$x \in \text{Ker } \lambda \Rightarrow 10^x = 1 \Rightarrow x = 0.$$

La surjectivité :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \lambda(\log_{10} y) = y.$$

Donc  $\lambda$  est une isomorphisme de groupe.



**16)**a) Le centre d'un groupe  $G$  étant désigné par  $Z(G)$ , démontrer la propriété :

$$H \leq G \Rightarrow Z(G) \cap H \leq Z(H)$$

b)  $G$  et  $G'$  étant deux groupes, si  $f$  est un épimorphisme de  $G$  sur  $G'$ , prouver que l'on a :  $f(Z(G)) \leq Z(G')$ **17)** Soit  $S$  une partie non vide d'un groupe  $G$ ; on pose :

$$C_G(S) = \{g \in G; gx = xg, \forall x \in S\}.$$

a) Vérifier que  $C_G(S)$  est un sous-groupe de  $G$ . $C_G(S)$  est appelé le *centralisateur* de  $S$  dans  $G$ . Si  $S = \{x\}$ , on le note  $C_G(x)$  et on l'appelle le *centralisateur* de  $x$  dans  $G$ .b)  $Z(G)$  étant le centre de  $G$ , démontrer la relation :  $\bigcup_{x \in G} C_G(x) = Z(G)$ c) Pour  $x \in G$ , posons  $H = C_G(x)$ ; Vérifier que  $x \in Z(H)$ .**18)** Soit  $A, B, C$  trois parties non vides d'un groupe  $G$ .Soit  $H\langle A, B \rangle$  le sous-groupe de  $G$  engendré par  $A \cup B$ .Si  $K = \langle A, B, C \rangle$  est le sous-groupe de  $G$  engendré par  $A \cup B \cup C$ , démontrer que  $K = \langle H, C \rangle$ .**19)** Démontrer que le groupe des quaternions (exemple (1.16)) est engendré par les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

**20)** Dans l'ensemble  $M_2(\mathbb{R})$  des matrices carrées d'ordre 2 sur  $\mathbb{R}$ , on considère le sous-ensemble  $\Gamma$  tel que :

$$\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} x & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R}^* \right\}.$$

Démontrer que  $\Gamma$  est un groupe par rapport à la multiplication des matrices, mais que ce groupe n'est pas un sous-groupe de  $GL_2(\mathbb{R})$ .Vérifier que le groupe  $\Gamma$  est isomorphe au groupe  $(\mathbb{R}^*, \times)$ .**21)** Soit  $n > 1$  dans  $\mathbb{N}$  et  $\left(\frac{\mathbb{Z}}{(n)}, +\right)$  le groupe des classes de congruence modulo  $n$ . On considère la correspondance  $\mu$  définie par :

$$\mu : \frac{\mathbb{Z}}{(n)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(n)} \rightarrow \frac{\mathbb{Z}}{(n)}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) \mapsto \overline{xy}.$$

- a) Prouver que la correspondance  $\mu$  est une application [c'est-à-dire que :  $(\overline{x'} = \overline{x}$  et  $\overline{y'} = \overline{y} \Rightarrow \overline{x'y'} = \overline{xy})$ ].  
En déduire que l'on peut définir dans  $\frac{\mathbb{Z}}{(n)}$  une multiplication telle que  $\overline{xy} = \overline{xy}$ .  
Montrer alors que  $\frac{\mathbb{Z}}{(n)}$  est un anneau unitaire. et commutatif.
- b) Soit, dans  $\mathbb{N}$ , un nombre premier  $p$ . On désigne par  $G_p$  l'ensemble des éléments non nuls de  $\frac{\mathbb{Z}}{(p)}$ .
- c) Preouver, en utilisant le résultat de l'exercice 4, que  $G_p$  est un groupe par rapport à la multiplication définie dans  $\frac{\mathbb{Z}}{(p)}$ .  
En conclure que  $\frac{\mathbb{Z}}{(p)}$  est un corps.
- d) Vérifier que si  $n$  n'est pas premier  $\frac{\mathbb{Z}}{(p)}$  n'est pas un corps.
- 

**22)** Vérifier que

$$\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

est un sous-groupe de  $GL(2, \mathbb{R})$  isomorphe au groupe  $GL\left(2, \frac{\mathbb{Z}}{(2)}\right)$ .

Ecrire la table de multiplication du groupe  $\Gamma$  ; en déduire que  $\Gamma$  est isomorphe au groupe symétrique  $S_3$ .

---

**23)**

- a) Démontrer les résultats suivants :

$$\Gamma_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

est un sous-groupe de  $GL(2, \mathbb{R})$ .

$$\Gamma_2 = \{1, i, -1, -i\} \text{ où } i^2 = -1,$$

est un sous-groupe de  $(\mathbb{C}^*, \times)$ .

$$\Gamma_3 = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$$

sous-ensemble de  $\frac{\mathbb{Z}}{(5)}$  est un groupe par rapport à la multiplication définie dans  $\frac{\mathbb{Z}}{(5)}$ .

- b) Prouver que  $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$  sont trois groupes isomorphes. Sont-ils cycliques ?
- 

**24)**

- a) Montrer que :

$$K_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

est un sous-groupe de  $GL(2, \mathbb{R})$  et que  $K_2 = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$ , sous-ensemble de  $\frac{\mathbb{Z}}{(8)}$ , est un groupe par rapport à la multiplication définie dans  $\frac{\mathbb{Z}}{(8)}$ .

- b) Vérifier qu ces deux groupes sont isomorphes. Ces groupes sont-ils isomorphes au groupe de Klein ?

25)

- a) Montrer que le groupe symétrique  $S_3$ , les groupes  $\Gamma_2$  et  $\Gamma_3$  de l'exercice 23 et le groupe  $K_2$  de l'exercice 24 admettent chacun une représentation matricielle fidèle de degré 2 sur  $\mathbb{R}$ .
- b) En associant à tout nombre complexe non nul  $a+ib$  la matrice  $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ , vérifier que le groupe multiplicatif  $\mathbb{C}^*$  admet aussi une représentation fidèle de degré 2 sur  $\mathbb{R}$ .

26) Soit  $P$  le plan affine euclidien. Si  $f$  est une isométrie du plan  $P$ , on dit qu'un point  $A$  est fixe pour  $f$  si  $f(A) = A$ .

On désigne par  $\mathcal{I}(2)$  l'ensemble des isométries du plan  $P$ .

Si  $\Delta$  est une droite de  $P$ , on note  $s_\Delta$  la symétrie du plan par rapport à  $\Delta$ ;  $s_\Delta : P \rightarrow P$ ,  $A'$  est tel que  $A \mapsto A'$ .

$\Delta$  est la médiatrice de  $AA'$ .

- a) Vérifier les propriétés suivantes :
- L'identité de  $P$ , notée  $id_P$ , appartient à  $\mathcal{I}(2)$ .
  - quelle que soit la droite  $\Delta$ ,  $s_\Delta$  appartient à  $\mathcal{I}(2)$  et  $s_\Delta \circ s_\Delta = id_P$ .
  - Si  $f_1$  et  $f_2$  sont dans  $\mathcal{I}(2)$ , alors  $f_2 \circ f_1 \in \mathcal{I}(2)$ ;  $f_2 \circ f_1$  sera appelé le produit de  $f_1$  et  $f_2$  dans  $\mathcal{I}(2)$ .
- b) Soit  $f \in \mathcal{I}(2)$ ; montrer que :
- si  $f$  à deux points fixes distincts  $A$  et  $B$ , alors tout point de la droite  $AB$  est fixe pour  $f$ ;
  - Si  $f$  à trois points fixes,  $A$ ,  $B$ ,  $C$  non alignés, alors  $f = id_P$ .
- c) Démontrer que toute isométrie  $f \in \mathcal{I}(2)$  est le produit de 0, 1, 2, ou 3 symétries.
- d) Prouver que  $\mathcal{I}(2)$  est un sous-groupe du groupe symétrique  $S_P$  et que  $\mathcal{I}(2)$  est non-abélien.
- e) A tout vecteur  $v$  de l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^2$  on associe la translation de vecteur  $v$  du plan affine  $P$ , notée  $t_v$ . Montrer à l'aide de (c) que  $t_v \in \mathcal{I}(2)$  et que  $\mathcal{T}(P) = \{t_v; v \in \mathbb{R}^2\}$  est un sous-groupe abélien de  $\mathcal{I}(2)$ , isomorphe à  $(\mathbb{R}^2, +)$ .
- f) Soit  $O$  un point du plan  $P$ , pour  $\alpha \in \mathbb{R}$ ; on note  $r_{O,\alpha}$  la rotation du plan  $P$  de centre  $O$  et d'angle  $\alpha$ . Montrer à l'aide de (c) que  $r_{O,\alpha} \in \mathcal{I}(2)$ .  $\mathcal{R}(P, O)$  désignant l'ensemble de toutes les rotations  $R_{O,\alpha}$  pour  $\alpha \in \mathbb{R}$ , vérifier que  $\mathcal{R}(P, O) = \{r_{O,\alpha}; 0 \leq \alpha < 2\pi\}$  et que  $\mathcal{R}(P, O)$  est un sous-groupe abélien de  $\mathcal{I}(2)$ .

27)

Notons  $\mathbb{C}$  le plan complexe, c'est-à-dire le plan affine euclidien  $\mathbb{R}^2$  rapporté à un système d'axes orthonormés  $Oxy$  et dont tout point  $M(x, y)$  est considéré comme l'image du nombre complexe  $z = x + iy$ .

A toute famille de 4 nombres complexes  $(a, b, c, d)$  telle que  $ad - bc \neq 0$ , on associe l'application :

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, \text{ où } z \in \mathbb{C}..$$

On remarque que si  $c \neq 0$ , le point  $-\frac{d}{c}$  n'a aucune image par  $f$ ; d'autre part le point  $\frac{a}{c}$  n'est l'image d'aucun point de  $\mathbb{C}$ . Pour remédier à ces difficultés, on rajoute au plan complexe un point dit à l'infini et noté  $\infty$ .

On pose  $\tilde{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ , pour  $c \neq 0$ ,  $f\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty$  et  $f(\infty) = \frac{a}{c}$ .

Une application telle que  $f$  est appelée une homographie du plan complexe.

- a) Montrer que toute homographie  $f$  est une permutation de  $\tilde{\mathbb{C}}$ .
- b) Démontrer que l'ensemble  $\mathcal{H}$  des homographies du plan complexe est un sous-groupe du groupe symétrique  $S_{\tilde{\mathbb{C}}}$ .
- c) En considérant le cas où  $c = 0$ , prouver que  $\mathcal{H}$  contient comme sous-groupes le groupe des similitudes et translations du plan complexe.
- d) Vérifier que l'homographie  $z \mapsto \frac{1}{z}$  est le produit (commutatif) de l'inversion de centre  $O$  et de puissance 1. et de la symétrie par rapport à l'axe  $Ox$ .
- e) Démontrer que toute homographie  $f$  du plan complexe conserve les angles et leurs orientation, ce que l'on exprime en disant que  $f$  est une transformation conforme du plan.
- f) Prouver que les homographies :

$$f_1 : z \mapsto z; \quad f_2 : z \mapsto -z; \quad f_3 : z \mapsto \frac{1}{z}; \quad f_4 : z \mapsto -\frac{1}{z}$$

forment un sous-groupe de  $\mathcal{H}$  isomorphe au groupe de Klein.

- g) Prouver que les homographies :

$$g_1 : z \mapsto z; \quad g_2 : z \mapsto \frac{1}{1-z}; \quad g_3 : z \mapsto \frac{z-1}{z},$$

$$g_4 : z \mapsto \frac{1}{z}; \quad g_5 : z \mapsto 1-z; \quad g_6 : z \mapsto \frac{z}{z-1}$$

forment un sous-groupe de  $\mathcal{H}$  isomorphe au groupe symétrique  $S_3$ .

28)

- a) Démontrer le corrolaire (1.49)
- b) Démontrer la proposition (1.53)

29)

Soit  $E$  un ensemble non vide et  $G$  un groupe d'élément unité  $e$ . On désigne par  $G^E$  l'ensemble des applications  $f$  de  $E$  dans  $G$ . On considère la loi de composition définie dans  $G^E$  par :

$$G^E \times G^E \rightarrow G^E$$

$$(f, g) \mapsto fg,$$

Où  $fg$  est telle que pour tout  $x \in E$ ,  $(fg)(x) = f(x)g(x)$ .

Prouver que  $(G^E)$  est ainsi muni d'une structure de groupe.

Vérifier que  $G^E$  est un groupe abélien si et seulement si  $G$  est abélien.

30)

$\mathbb{R}$  désignant le groupe additif des réels, on pose :

$$J = \{x \in \mathbb{R}; 0 \leq x \leq 1\}.$$

L'addition de  $\mathbb{R}$  induit dans l'ensemble  $\mathbb{R}^J$  une structure de groupe additif abélien.

- a) Vérifier les propriétés suivantes :

- l'ensemble des fonctions  $f \in \mathbb{R}^J$ , continues sur  $J$ , est un sous-groupe de  $(\mathbb{R}^J, +)$ , que l'on notera  $\mathcal{C}(J)$ ;
- si, pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , on note  $c_a$  la fonction constante de  $J$  dans  $\mathbb{R}$  telle que  $c_a(x) = a$  pour tout  $x \in J$ , alors  $\Gamma = \{c_a; a \in \mathbb{R}\}$  est un sous-groupe de  $(\mathcal{C}(J), +)$ .

b) On considère les applications  $F_i$  de  $\mathcal{C}(J)$  dans  $\mathbb{R}$  telles que :

$$F_1 : f \mapsto f(1), \quad F_2 : f \mapsto |f(0)|, \quad F_3 : f \mapsto \int_0^1 f(x) dx$$

$$F_4 : f \mapsto \frac{\pi}{3} \int_0^1 f(x) \cos \frac{\pi x}{6} dx, \quad F_5 : f \mapsto \int_0^1 \cos \frac{\pi f(x)}{6} dx.$$

Déterminer les  $F_i$  qui sont des homomorphismes de groupes de  $(\mathcal{C}(J), +)$  dans  $(\mathbb{R}, +)$ . Pour chacun des morphismes de groupes  $F_i$ , prouver que, quel que soit  $a \in \mathbb{R}$ ,  $F_i(c_a) = a$  et montrer qu'il existe un unique  $m_i \in \mathbb{R}$  tel que  $F_i(id_J - C_{m_i}) = 0$ . En déduire que les  $\text{Ker } F_i$  sont deux à deux distincts.

c) Démontrer que pour tout  $F \in \text{Hom}(\mathcal{C}(J), \mathbb{R})$ , tel que  $F(c_a) = a$ , quel que soit  $a \in \mathbb{R}$ , on a

$$\mathcal{C}(J) = \text{Ker } F \oplus \Gamma.$$

En conclure qu'il existe de nombreux sous-groupes de  $\mathcal{C}(J)$  tels que  $\mathcal{C}(J) = H \oplus \Gamma$ .

**31)**

Soit deux groupes  $G_1$  et  $G_2$ .

- a) Prouver que les groupes  $G_1 \times G_2$  et  $G_2 \times G_1$  sont isomorphes.
- b)  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  étant aussi deux groupes, démontrer la propriété :  $(\Gamma_1 \simeq G_1 \text{ et } \Gamma_2 \simeq G_2) \Rightarrow \Gamma_1 \times \Gamma_2 \simeq G_1 \times G_2$ .
- c) Si  $H_1$  et  $H_2$  sont respectivement des sous-groupes de  $G_1$  et  $G_2$ , montrer que  $H_1 \times H_2$  est un sous-groupe de  $G_1 \times G_2$ .

Déterminer tous les sous-groupes de  $\frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2)}$ ; en déduire compte tenu des notations précédentes, qu'un sous-groupe de  $G_1 \times G_2$  n'est pas nécessairement de la forme  $H_1 \times H_2$ .

**32)**

Pour deux groupes  $G_1$  et  $G_2$ , démontrer les propriétés :

- a)  $G_1 \simeq G_2 \Rightarrow \text{Aut}(G_1) \simeq \text{Aut}(G_2)$
- b)  $G_1 \simeq G_2 \Rightarrow \text{Int}(G_1) \simeq \text{Int}(G_2)$ .

**33)**

Soit  $\{G_i\}_{i \in I}$  une famille de groupes; montrer que, pour tout groupe  $G$ , l'ensemble  $\text{Hom}\left(G, \prod_{i \in I} G_i\right)$  est équivalent à l'ensemble  $\prod_{i \in I} \text{Hom}(G, G_i)$ .

# CLASSES MODULO UN SOUS-GROUPE

---

1) TEST

---

TESTSOL

---